




Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 1 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig		Granskad av	Godkänd av
Sign: 		Sign: 	Sign: 
Namn, titel, datum Milie Bergvall, överläkare		Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson
			Gäller t o m 250401 Ersätter tidigare version daterad Ny

Fyll i och ersätt grå text

Dessa direktiv gäller för patienterna på ovan definierad enhet/er.




Sjuksköterskor får efter behovsbedömning, dela ut läkemedel enligt nedanstående ordination. Läkemedel får ges under maximalt ett dygn. Om behov kvarstår därefter krävs ordination av läkare. Exempel i grått (hela raden i tabellen nedan) tas bort innan signering.

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation: segt slem</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: upplöses i ett halvt glas vatten</i>	Acetylcystein 1A Farma, brustablett 200mg	1st	3	3st	po
<i>Indikation: smärta, feber</i> <i>Kontraindikation: svår leversvikt</i> <i>Anmärkning: upplöses i ett halvt glas vatten.</i>	Alvedon brustablett 500 mg	1-2 st	4	8 st	po
<i>Indikation: smärta, feber</i> <i>Kontraindikation: svår leversvikt</i> <i>Anmärkning:</i>	Alvedon filmdragerad tablett 500 mg	2 st	4	8 st	po
<i>Indikation: klåda, utslag, allergi</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: Förstahandsval vid läkemedelsexantem</i>	Desloratadine filmdragerad tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po
<i>Indikation: kramper</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: om ingen effekt ses efter 10 minuter kan ytterligare en 10 mg tub ges till vuxna. Doseringen kan upprepas var 12:e timme. Vid initialt högre doser eller upprepad</i>	Diazepam Desitin rektallösning 10 mg	1-2 st	2	4 st	rektalt

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24




Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 2 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig		Granskad av	Gäller t o m
Sign: 		Sign: 	Sign: 
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare		Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson
			250401 Ersätter tidigare version daterad Ny

Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>behandling skall andningen följas.</i>					
<i>Indikation: tillfällig förstoppning</i> <i>Kontraindikation: ileus</i> <i>Anmärkning: tarmretande</i>	Dulcolax suppositorium 10 mg	1 st	1	1 st	rektalt
<i>Indikation: senil oro, aggressivitet</i> <i>Kontraindikation: myastenia gravis, sömnappné, akut lunginsufficiens</i> <i>Anmärkning: till natten</i>	Heminevrin kapsel mjuk, 300 mg	1-2 st	2	2 st	po
<i>Indikation: värk</i> <i>Kontraindikation: ASA-överkänslighet. Försiktighet vid astma, ulcus och preop. Ej till gravida. Ej heller vid hjärtsvikt, nedsatt njurfunktion. Olämpligt till äldre (>70 år)</i> <i>Anmärkning:</i>	Ibumetin tablett 400 mg	1 st	3	3 st	po
<i>Indikation: tillfällig obstipation</i> <i>Kontraindikation: ileus, blödning eller inflammation i tarmen</i> <i>Anmärkning:</i>	Klyx rektallösning 1 mg/ml+ 250 mg/ml	1 st	1	1 st	rektalt
<i>Indikation: tillfällig obstipation</i> <i>Kontraindikation: ileus</i>	Laxoberal orala droppar, lösning 7,5 mg/ml	10- 15drp	1	15 drp	po

Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett **Generella direktiv om läkemedelsbehandling**
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 3 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny




Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Anmärkning: tarmretande, till natten</i>					
<i>Indikation: tillfällig obstipation</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning:</i>	Microlox rektallösning	1 st	1	1 st	rektalt
<i>Indikation: hosta</i> <i>Kontraindikation: grön starr</i> <i>Anmärkning: försiktighet vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperthyreos, diabetes mellitus. Kan ge urinretention, OBS vid prostataförstoring</i>	Mollisupradin oral lösning 0,5 mg/ml + 1 mg/ml	15 ml	4	60 ml	po
<i>Indikation: svår smärta</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: ej vid fraktursmärta eller smärta under gips. Kan ge andningsdepr. Antidot: Naloxon. Vid iv admin ska 1 ml morfin först spädas med 9 ml NaCl spädningsvätska till 1 mg/ml. Av den spädda lösningen ska 2,5-5 ml (= 2,5-5 mg) ges till pat.</i>	Morfin injektionsvätska, lösning 10 mg/ml	0,25 – 0,5 ml	4	2 ml	iv
<i>Indikation: svår smärta postop, cancersmärta</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: ej vid fraktursmärta eller smärta under gips. Kan ge andningsdepr. Antidot: Naloxon. Vid sc administrering ska morfinet inte spädas</i>	Morfin injektionsvätska, lösning 10 mg/ml	0,25 – 1 ml	4	2 ml	sc

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24




Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 4 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenheter: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny

Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Dos postop smärta 0,25-0,5ml=2,5-5mg, cancersmärta 0,5-1ml=5-10mg</i>					
<i>Indikation: obstipation</i> <i>Kontraindikation: magsmärtor utan känd orsak</i> <i>Anmärkning:</i>	Movicol pulver till oral lösning i dospåse	1 st	2	2 st	po
<i>Indikation: nikotinabstinens vid ordinarie intag < 20 cig/dag</i> <i>Kontraindikation: akut infarkt, instabil angina, hjärtarytmi, nylig stroke</i> <i>Anmärkning:</i>	Nicotinell depotplåster 14 mg/24 timmar	1 st	1	1 st	utvärtes
<i>Indikation: nikotinabstinens vid ordinarie intag > 20 cig/dag</i> <i>Kontraindikation: akut infarkt, instabil angina, hjärtarytmi, nylig stroke</i> <i>Anmärkning:</i>	Nicotinell depotplåster 21 mg/24 timmar	1 st	1	1 st	utvärtes
<i>Indikation: halsbränna, gastrit</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: ej vid behandling med Doxyferm eller Ciprofloxacin, ej tillsammans med järn</i>	Novaluzid tuggtablett	1-2 st	3	6 st	po

Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 6 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny




Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Kontraindikation: ej vid smärta under gips, fraktursmärta</i> <i>Anmärkning: Kan ge andningsdepr. Antidot: Naloxon.</i>					
<i>Indikation: smärta hos fastande patient, feber</i> <i>Kontraindikation: svår leversvikt</i> <i>Anmärkning: 100ml= 1g, 400ml=4g.</i>	Paracetamol infusionsvätska, lösning 100 mg/ml	100 ml	4	400 ml	iv
<i>Indikation: smärta, feber</i> <i>Kontraindikation: svår leversvikt</i> <i>Anmärkning:</i>	Paracetamol suppositorium 1 g	1 st	4	4 st	rektalt
<i>Indikation: vätskeersättning inför op</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning:</i>	Plasmalyte infusionsvätska	1000 ml	1	1000 ml	iv
<i>Indikation: illamående</i> <i>Kontraindikation: myastenia gravis, grön starr</i> <i>Anmärkning: kan ge urinretention</i>	Postafen tablett 25 mg	1 st	2	2 st	po

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY

Version 4.0, 2022-10-24

Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 5 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny




Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. Låt kursiva underrubriker vara kvar.	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>och tetracyclinpreparat</i>					
<i>Indikation: munsvamp</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: håll kvar i munnen så länge som möjligt</i>	Nystatin oral suspension 100 000 IE/ml	1 ml	4	4 ml	po
<i>Indikation: magsårsprofylax</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning:</i>	Omeprazol enterokapsel hård 20 mg	1 st	1	1 st	po
<i>Indikation: illamående postop och vid maligna sjukdomar</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: ej vid nedsatt njurfunktion eller i graviditetens första trimester. Risk för extrapyramidala biverkningar</i>	Ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml	2 ml	2	4 ml	iv
<i>Indikation: oro, ångest</i> <i>Kontraindikation: Resp.insuff, myastenia gravis, sömnapné</i> <i>Anmärkning:</i>	Oxascand tablett 5 mg	1 st	2	2 st	po
<i>Indikation: svår smärta postop. Som komplement till Oxycontin vid cancersmärta. För behandling av genombrottsmärta hos cancerpat.</i>	OxyNorm kapsel 5 mg	1 st	4	4 st	po

Generella direktiv revideras årligen
Original förvaras på enheten
Arkiveras enligt rutin SOFIA STY




Version 4.0, 2022-10-24

Bilaga 1, Styrdokument Generella direktiv om läkemedelsbehandling
(go), tidigare Barium-id 29946
Blankett *Generella direktiv om läkemedelsbehandling*
(benämnd go i Melior)

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 8 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenhet/er: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namn/förtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny

Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gångar per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Kontraindikation: Myastenia gravis, sömnapné, leversvikt, respiratorisk svikt</i>					
<i>Anmärkning: till natten</i>					

Dokumentnamn		Gäller vid	Sidan 7 av 8
Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller för Meliorenheter: LOKA (Ortopedi- och Kirurgiavdelning Lidköping)	Verksamhetsområde: VO5 - Ortopedi
Innehållsansvarig	Granskad av	Godkänd av	Gäller t o m
Sign: 	Sign: 	Sign: 	250401
Namn, titel, datum Mile Bergvall, överläkare	Namn, titel (läkemedelsansvarig läkare) Lotta Kettil	Namnförtydligande, datum (Verksamhetschef) Cecilia Andersson	Ersätter tidigare version daterad Ny

Fyll i och ersätt grå text

Indikation, kontraindikation och anmärkning (kommer att synas i anvisningsruta i Melior). Maximalt 250 tecken. <i>Låt kursiva underrubriker vara kvar.</i>	Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm sätt
<i>Indikation: illamående</i> <i>Kontraindikation: EP, Parkinson, ileus</i> <i>Anmärkning: kan ge extrapyramidala biverkningar, varning nedsatt njurfunktion och äldre pat, ej sista trimestern.</i>	Primperan injektionsvätska, lösning 5 mg/ml	2 ml	3	6 ml	iv
<i>Indikation: illamående</i> <i>Kontraindikation: EP, Parkinson, ileus</i> <i>Anmärkning: kan ge extrapyramidala biverkningar, varning nedsatt njurfunktion och äldre pat, ej sista trimestern.</i>	Primperan tablett 10 mg	1 st	3	3 st	po
<i>Indikation: klåda, utslag, allergi</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: försiktighet vid myastenia gravis och grön starr. Kan ge urinretention. Lämpligt vid ikterus. Sederande.</i>	Tavegyl tablett 1 mg	1 st	2	2 st	po
<i>Indikation: illamående postop och vid maligna sjukdomar</i> <i>Kontraindikation:</i> <i>Anmärkning: ej vid nedsatt njurfunktion eller i graviditetens första trimester. Risk för extrapyramidala biverkningar</i>	Zofran filmdragerad tablett 4 mg	1-2 st	2	2 st	po
<i>Indikation: insomningssvårigheter</i>	Zopiklon tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po