

Överlämning avseende PSA-uppföljning efter radikal prostatektomi

Ifylles av ansvarig läkare och överlämnas till medicinsk sekreterare för fortsatt åtgärd. Observera att ett av två uppföljningsprogram väljs, där intervallen för provtagning första året skiljer sig åt. Vid PSA <0,10 skickas standardbrev. Vid PSA ≥ 0,10 tas kontakt med kontaktsjuksköterska. För ytterligare instruktioner hänvisas till styrdokument "Radikal prostatektomi – uppföljning".

- Opererande läkare:
- Operationsdatum:
- Uppföljningsschema 1 – tätare kontroller första året
 - Tillämpas vid Gleason 8-10, pT3 eller pos marginal
- Uppföljningsschema 2 – glesare kontroller första året
 - Tillämpas vid övriga fall
- **Prel datum för kommande PSA-kontroll via med sekreterare:**

Fas i provtagningen för nästkommande kontroll inringas nedan

Tid efter operation	Schema 1	Schema 2	Åtgärd
4 månader	X		Standardbrev
6 månader		X	Standardbrev
8 månader	X		Standardbrev
1 år	X	X	Standardbrev
1,5 år	X	X	Standardbrev
2 år	X	X	Standardbrev
2,5 år	X	X	Standardbrev
3 år	X	X	Standardbrev
4 år	X	X	Standardbrev
5 år	X	X	Standardbrev
6 år	X	X	Standardbrev
7 år	X	X	Standardbrev
8 år	X	X	Standardbrev
9 år	X	X	Standardbrev
10 år	X	X	Till läkare för åtgärd