

# Information angående diures (urinmängd) till dig som opereras

För att underlätta för ditt barn att kissa kan ni prova att låta barnet duscha och kissa i duschen, eller att ge barnet ett minilavemang (resulax). Om barnet inte kissat på vårdenheten/UVA före hemgång och inte har kunnat kissat hemma innan den går och lägger sig för natten, ska ni söka till barnakuten.

Orsaken är att det händer att barn kan få svårt att kissa efter att de varit sövda och/eller fått bedövning. Om urinblåsan är utspänd en längre tid kan musklerna i urinblåsan försvagas. Detta vill vi undvika. Om urinblåsan är överfull får barnet svårt att kissa själv och behöver då få hjälp med att tömma urinblåsan på sjukhuset.

Zahraa Mahdi

Läkare AN/OP/IVA

Jag har tagit del av ovanstående information

Datum

---

Underskrift (patient/vårdnadshavare)

---

Barnets personnummer

---

Denna blankett finns i två exemplar. Ett exemplar får patienten med sig hem, ett exemplar förvaras i patientens journal.

# Information angående diures (urinmängd) till dig som opereras

För att underlätta för ditt barn att kissa kan ni prova att låta barnet duscha och kissa i duschen, eller att ge barnet ett minilavemang (resulax). Om barnet inte kissat på vårdenheten/UVA före hemgång och inte har kunnat kissat hemma innan den går och lägger sig för natten, ska ni söka till barnakuten.

Orsaken är att det händer att barn kan få svårt att kissa efter att de varit sövda och/eller fått bedövning. Om urinblåsan är utspänd en längre tid kan musklerna i urinblåsan försvagas. Detta vill vi undvika. Om urinblåsan är överfull får barnet svårt att kissa själv och behöver då få hjälp med att tömma urinblåsan på sjukhuset.

Zahraa Mahdi

Läkare AN/OP/IVA

Jag har tagit del av ovanstående information

Datum

---

Underskrift (patient/vårdnadshavare)

---

Barnets personnummer

---

Denna blankett finns i två exemplar. Ett exemplar får patienten med sig hem, ett exemplar förvaras i patientens journal.