

Västra Götalandsregionen

Skaraborgs Sjukhus

M4

Datum: 2002-05-27

Bilaga till styrdokument "Procedursedering med ketanest på akuten för vuxna"

(SKAS9678-1600500551-53)

Bilaga 1 Checklista vid procedursedering

Patientuppgifter	Vikt
	Fasta sedan
	ASA-klass

- Läkemedel finns förberedda och uppdragna
- Ansvarig läkare har förmedlat plan vid eventuella biverkningar
- Teammedlemmar som kan basal luftvägshantering är på plats

På rummet ska finnas

- Luftvägsväska alternativt
 - Andningsblåsa med mask, "Rubens blåsa", alternativt pocketmask för manuell ventilering.
 - Svalgtub i olika storlekar
 - Nasofarynx-tub, "kantarell"
 - Larynxmask
- Larmknapp
- Fungerande sug
- Brits som går att tippa

- Teamet ska ha vetskap om var defibrillator finns att hämta

Kontroller att ta innan proceduren

- EKG kontrolleras hos patienter över 65 år
- Blodtryck, andningsfrekvens, POX samt puls mäts och dokumenteras
- Syrgas administreras på gramma i samband med proceduren
- Patienten förses med fungerande venös infart
- Patienten förses vid behov med hörselskydd

Uppkoppling under proceduren

- POX-klämma på
- Blodtryck 5 min efter injektion
- Kontinuerlig tillsyn

Efter proceduren

- Patienten ska fortsatt ha tillsyn fram till dess att patienten är fullt vaken och förmögen till förflyttning och kommunikation på samma sätt som innan sederingen
- Vitalparametrar ska vara normala för patienten innan kontroller avslutas
- Vid eventuell hemgång från akutmottagningen ska patienten uppmanas att de närmsta 24 timmarna avstå från aktiviteter såsom att köra bil, framföra tunga motorfordon, simma ensam etc.

Bilaga 2

Lathund vid procedursedering med Ketanest

Läkemedel	Anslagstid/ duration	Initialdos	Maxdos	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
Ketanest 5 mg/ml	5 min/ 10-25 min	0,125-0,25 mg/kg	0,5 mg/kg	6,25 – 12,5 mg MAX 25 mg	7,5 – 15mg MAX 30 mg	8,75 – 17,5 mg MAX 35 mg	10 – 20 mg MAX 40 mg	11,25 – 22,5 mg MAX 45 mg	12,5 – 25 mg MAX 50 mg
Midazolam 1 mg/ml <small>Förebygger hallucinationer</small>	1-5 min/ 0,5 - 2 tim <small>Observera lång durationstid!</small>	0,5-2 mg Äldre 0,5 – 1 mg Yngre 2 mg							
Atropin <small>Vid ökad salivutsöndring</small>		0,5 mg iv							