

Du är opererad för prostatacancer

Robotassisterad radikal prostatektomi

Operationen

Prostatakörteln och sädesblåsorna har avlägsnats via tithålskirurgi med hjälp av en operationsrobot. Vävnaden har skickats för mikroskopisk analys. Urinblåsan och urinröret har avlastats med en kateter som ska sitta i minst 7 dagar. Katetern är mycket viktig och bör endast hanteras av personal med speciell kompetens.


Den närmaste tiden

Blod i urinen, trängningar, sekretion och mindre urinläckage är vanligt efter operationen. Smärta i området mellan ändtarmsöppningen och pungen är också vanligt efter och brukar avta successivt men kan bli mer framträdande när du sitter. Vid blod i urinen är det viktigt att dricka rikligt för att tunna ut urinen.

Undvik tunga lyft, krävande fysisk aktivitet de första 2-3 veckorna och cykling de första 2 månaderna efter operationen då det kan orsaka blödning från operationsområdet och försena läkningen. Avföringen bör också hållas mjuk för att undvika krystning.

Du kommer att kallas till uroterapeut för kateteravveckling och avlägsnande av sårklamrar från operationssåret. Sårförbandet kan du ta bort efter 5 dagar och vid behov sätta på ett vanligt plåster.

När den mikroskopiska analysen av prostatakörteln är klar kommer du även att kallas för ett läkarbesök ca 6 veckor efter operationen.



Kontakta sjukvården vid

- feber $\geq 38^{\circ}$
- svåra smärtor
- kraftig blödning
- svårigheter att tömma urinblåsan
- stopp i katetern (Obs katetern ska endast skötas av urolog)

Urologiavdelningen

Om du vårdats inneliggande, upp till en vecka efter utskrivning

Telefon 0500-43 18 18

Uroterapi

Telefon 0500-47 83 90

Urologimottagningen

Måndag - torsdag 08:00-09:30

Fredag 08:45-09:30

Telefon 0500-43 17 74

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon 1177