

Du är opererad för trång förhud

Circumcisio



Operationen

Du är opererad med circumcision, som även kallas omskärelse. Det innebär att förhuden avlägsnats helt eller delvis. Kanterna har sytts ihop med tråd som försvinner av sig själv efter några veckor.

De närmaste dagarna

Svullnad, missfärgning eller vätskning över operationsområdet är vanligt och kvarstå några veckor. För att minska svullnaden är det bra om förbandet du får under operationen sitter kvar första dygnet. Du kan använda lokalbedövnings-salva på operationsområdet vid sveda. Den kan appliceras flera gånger per dag.

Det är viktigt att duscha operationsområdet med ljummet vatten dagligen, samt undvika bassängbad för att minska infektionsrisken de första 4 veckorna. Du bör även undvika aktivitet som medför friktion eller skav av operationsområdet under denna tid.



Kontakta sjukvården vid

- feber $\geq 38^{\circ}$
- svåra smärtor
- kraftig blödning
- tilltagande svullnad, rodnad eller varbildning i operationsområdet
- svårigheter att tömma urinblåsan

Urologiavdelningen

Om du vårdats inneliggande, upp till en vecka efter utskrivning

Telefon 0500-43 18 18

Urologimottagningen

Måndag - Fredag 08:00-09:00

Telefon 0500-43 17 74

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon 1177