

# Information till dig som fått blod- eller trombocyttransfusion i hemmet av SkaS mobila närsjukvårdsteam

Även om det är ovanligt kan kroppen reagera efter en transfusion. Om reaktion uppstår inom 24 timmar efter transfusionen är det viktigt att det görs en bedömning ifall det vidare skall utredas om reaktionen har med transfusionen att göra.

Du har den \_\_\_\_\_ fått transfusion med blod/trombocyter.

Transfusionen avslutades kl. \_\_\_\_\_.

Om du inom 24 timmar känner dig så pass påverkad att det inte kan vänta ska du ringa 112 alternativt själv söka vård på akutmottagning.

**Glöm inte att ta med den/de tomma blod- eller trombocytpåsar som lämnats i ditt kylskåp.**

Om du fått en reaktion som inte är akut och du:

- Är inskriven i hemsjukvården – ta kontakt med din ansvariga sjuksköterska.
- Har en vårdkontakt på sjukhuset - kontakta \_\_\_\_\_mottagningen dagtid och \_\_\_\_\_avdelningen kvällstid samt helger.
- Inte har någon fast vårdkontakt – kontakta Närsjukvårdsteamet på 0500-49 94 00 (mån-tors 7:30 – 20:30, fre-sön 7:30 – 16:00)