

## Checklista vid Taxol-/Paklitaxel- och Karboplatinbehandling

Datum: .....

Blodtryck: .....

Puls: .....

Vikt: .....

Preparat	Klockan
NaCl	spoldropp
T Desloratadin 5 mg, 2 tabl	1 tim före Taxol
Inj Betapred 16 mg (8 mg till pat med diabetes)	30 min före Taxol
Bltr	Puls
Taxol, starta inf långsamt beh 1 och 2*	3 timmar
Bltr	Puls
	efter 15 min
Taxol	avslutat
Bltr	Puls
Antiemetika, T Zofram 8 mg	1 tim före Karboplatin
Karboplatin	30 min
Beh avslutad	
Vid hög risk för allergisk reaktion på Karboplatin (vilket kan föreligga efter behandling nr 7 totalt sett, även om det är flera år sedan patienten fick behandling med Karboplatin), ska patienten även premedicineras med Tavegyl 2 mg (tillsatt i 100 ml NaCl). Karboplatin ska vid högrisk ges på 1 timme. Övervaka patienten under hela infusionen.	

\* Cirka 30 ml/h, öka successivt till normal hastighet efter 40 ml. Om patienten har fått infusionsreaktion på behandling nr 1 eller 2 bör även behandling nr 3 startas långsamt.