

Datum: 2026-03-25

Smittskydd Västra Götaland

Diarienummer: SMSK 2026-00026

E-post: smittskydd@vgregion.se

Klamydia

Klamydia, som orsakas av bakterien *Chlamydia trachomatis*, är den vanligast rapporterade sexuellt överförbara infektionen i Sverige.

Utfall och trend

Under år 2025 rapporterades 4 112 fall med klamydia, vilket motsvarar en incidens på 231 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 11 procent jämfört med året innan, vilket visar på en fortsatt nedåtgående trend hos både män och kvinnor, och i stort sett i alla åldersgrupper, se tabell 1.

Högst incidens sågs i åldersgruppen 20–24 år, se figur 1. Av årets fall var 72 procent i åldersgruppen 15–29 år.

Andelen smittade via sexuell kontakt med motsatt kön dominerar fortsatt och fler kvinnor än män rapporteras i denna grupp, se figur 2. En klar majoritet smittas i Sverige, se tabell 1.

Antalet fall minskade i samtliga fyra smittskyddsområden. Som tidigare var incidensen högst i Göteborgsområdet. Incidensen under år 2025 jämfört med föregående år var: Göteborgsområdet 295 (330), Skövde 185 (205), Borås 172 (225) och Uddevalla 169 (179).

I Västra Götaland finns sedan hösten 2025 möjligheten att beställa självprov beroende på hur man haft sex. Den som till exempel haft både oralsex, analsex och vaginalsex kan beställa flera prov och ta prov från fler provtagningslokaler.

Lymfogranuloma venereum (LGV)


LGV orsakas av *Chlamydia trachomatis* serotyper L1-L3, och kan ge en allvarligare sjukdomsbild och kräver längre behandlingstid än klamydia. LGV svaras ut som klamydia i sedvanlig klamydiaprovtagning men för att ställa diagnos krävs tilläggsanalys. Under året rapporterades inga sådana fall.

Från årsskiftet 2025/2026 förbättras möjligheten i Västra Götaland att upptäcka LGV. Alla positiva rektala klamydiaprover hos män kommer då att serotypas vidare för LGV.

Tabell 1. Antal fall med klamydia per ålder, kön, smittland Sverige respektive utomlands samt smittväg, år 2023–2025

	2023	2024	2025
	N = 2 521	N = 4 633	N = 4 112
Medianålder	23	24	24
(nedre, övre kvartil)	(20, 29)	(20, 30)	(20, 31)
Åldersgrupp			
0–19	1 099 (21 %)	958 (21 %)	790 (19 %)
20–29	2 942 (56 %)	2 407 (52 %)	2 184 (53 %)
30–39	815 (16 %)	804 (17 %)	757 (18 %)
40+	395 (7,5 %)	464 (10 %)	381 (9,3 %)
Kön			
Kvinna	2 821 (54 %)	2 572 (56 %)	2 245 (55 %)
Man	2 429 (46 %)	2 059 (44 %)	1 866 (45 %)
Uppgift saknas	1 (<0,1 %)	2 (<0,1 %)	1 (<0,1 %)
Smittland			
Sverige	4 680 (89 %)	4 111 (89 %)	3 653 (89 %)
Utomlands	400 (7,6 %)	362 (7,8 %)	334 (8,1 %)
Uppgift saknas	171 (3,3 %)	160 (3,5 %)	125 (3,02 %)
Smittväg			
Annan/Uppgift saknas	239 (4,6 %)	243 (5,2 %)	180 (4,4 %)
Sexuell kontakt med båda könen	81 (1,5 %)	54 (1,2 %)	42 (1,0 %)
Sexuell kontakt med motsatt kön	4 590 (87 %)	4 043 (87 %)	3 653 (89 %)
Sexuell kontakt med samma kön	341 (6,5 %)	293 (6,3 %)	237 (5,8 %)

Figur 1. Incidens av klamydia per kön och åldersgrupp, år 2016–2025



Figur 2. Antal fall med klamydia per smittväg, år 2016–2025

