

# اطالع رسانی به بیماران

Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydrokortiazid, Marozid	losartan	
Teveten/Comp	eprosartan	
Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydrokortiazid	valsartan	
Valsartan/Hydrokortiazid	Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto	
Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirma combi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea	irbesartan	
Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesartan, Candesartan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,	kandesartan	
Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydrokortiazid, Tolura, Tolucombi	telmisartan	
داروی علیه دیابت		
Metformin, Comptact, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo	metformin	
Jardiance, Synjardy, Glyxambi	empagliflozin	
Invokana, Vokanamet	kanagliflozin	
Forxiga, Xigduo, Qtern	dapagliflozin	
Steglatro, Segluromet, Steglujan	ertugliflozin	
سایر داروهای		

از دارویی شنکین درد بصورت بماد ژله ای با ایپیری می شواند ابرناده کنید.  
 مصرف فرص و شربت دارای ماده پاراستامول (مانند Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin نیز مانع ندارد.

میجوقت بیش از دوز (میدار مصرف) نجات نیز تردد دارو مصرف نکند!

## خطاب به افرادی که با داروهای

دارای ریسک برای عوارض جانبی جدی هنگام ابتلاء به بیمارهای اضطراری همراه با کمبود مایعات بدن مداوا می شوند

- اسهال
- اسیدراغ
- تب شدید (بالای 38 درجه سانتیگراد)
- گرمایشگی
- بیماری اضطراری همراه با دشواری در خوردن و نوشیدن

شما با این دارو مدوا می شوید:  
داروی تسکینی لرد

Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte	diklofenak
Brexitol	piroxikam
Alganex	tenoxikam
meloxicam	meloxicam
Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin	ibuprofen
Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo	naproxen
Orudis/Retard	ketoprofen
Tradil	dexibuprofen
Enantyum, Ketesse	dexketoprofen
Celebra, Celecoxib	celecoxib
Arcoxia, Turox	etoricoxib
Relifex	nabumeton
داروهای ادرار آور	
Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite	bendroflumetiazid
Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hydrokloriazid	hydrokloriazid
Hygropax	klortalidon
metolazon	metolazon
Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard	furosemid
Burinex	bumetanid
Torasemid, Torem	torasemid
Spironolactone, Spironolakton	spironolakton
Eplerenon, Inspira	eplerenon
amilorid	amilorid
داروهای علیه بیماری های قلب و عروق و نشار خون بالا	
Digoxin, Lanoxin	digoxin
Captopril	kaptopril
Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp	enalapril
Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid	lisinopril
Coversyl Novum	perindopril
Ramipril, Triatec, Ramipril/Hydroklorotiazid	ramipril
fosinopril	fosinopril
Accupro Comp	kinapril

برخی از داروهایی که علیه بیماری های قلب و عروق، فشار خون بالا، درد و دپایت اینفلاده می شوند اگر هنگامی صرف شوند که مراجعات بدن نامعadel هسنهند، ممکن است باعث بروز عوارض جانبی جدی شوند.

بخار اطراف داشته باشید:

این داروهای هنگام کمبود مراجعات بدن مثال هنگام استنراخ، ایس هل، تب، گرمای شدید با حالتی که شما نتوانید بخوبیه یا بیانیه امید منجربه بروز عارضه جانبی جدی می شوند. ریسک بروز عارضه جانبی جدی در میزبان بالا و در موارد کاهش کارکرد کلیه این ایش می پاید.

در صورت کمبود مراجعات بدن چه باید کرد؟

اگر با هریک از داروهایی پاد نزد مداوا می شوید در صورت بروز وضعیت هایی که بدن دچار کمبود مراجعات می شود با پرستی هصرفت دارو را اففع کنید. اگر زاراحتی های شما دایه هی نباشند مداوا با دارو می تواند بالا صافله پس از رفع زاراحتی از سرگرفته شود.

در صورت عدم اطمینان با خدمات درمانی تماس بگیرید!