

معلومات إبل من يتلقى العلاج بواسطةأوبيويد (opioid) بسبب الألم الحاد



Information till dig som får behandling
med opioid för akut smärta

Terapigrupp Smärta, april 2018

معلومات إلى من يتلقى العلاج بواسطة أوبيويد (opioid) بسبب الألم الحاد

لقد حصلت على وصفة بالدواء المسكن للألم:

يطلق اسمها أوبيويد (opioid). ويكون أوبيويد إما مورفينًا أو دواء ثريبيا. بالإضافة إلى أن له المخاطر نفسها من حيث الأعراض والمادة الفعالة تستخدم

كعلاج مسكن للألم، وهي كلها بالمورفين وله تأثير التسكين نفسه، الجانبية والاعتماد كما المورفين. وكل أدوية أوبيويد

وإذا حصلت على مادة الكودينين (kodein) الموجودة في الدواء سيتولون داخل الجسم. وال نرجس أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول مصدرة السموات

(Citodon) (مثال، ناهيا تتحول إلى مورفين

فالمهم على نحو خاص أن تخبره إذا كنت تتناول أدوية مهدئة أو منومة مثال: وكذلك أخبره إذا كنت تتناول الأدوية ال تحتاج إلى وصفة طبية أدوية أخرى.

بنسوديازيبين/ (bensodiazepiner).

أو مستحضرات طبيعية.

التأثيرات والأعراض الجانبية

تتجلى على أوبيويد بعبارة جيدة جدًا. فهي تسكين الألم الحاد، ومن المهم أن تتبينه أن تأخذ الدواء حسب الجرعة التي تعطيك التسكين تمنع الأدوية في التعليمات التي حصلت عليها.

والهدف

يجب تكون الأعراض الجينية أقل لم يمكن. وعندما يكون تسكين الألم غير كافٍ

لنفي أن تصبح الآلام طويلة المد وعالجها أصعب. ومن الناحية الأخرى، تسبب زيادة أعراضه الجانبية، مثل: الغثاس والمهسا سيكون هناك فإن زيادة جرعة أوبيويد

عن الحد الأدنى

واضطراب النوم، كما أن أوبيويد يضعف القدرة على التنسيق والتوازن. والغثاس

من أجل ذلك ننصحك أن تمتنع أثناء العلاج عن قيادة السيارة أو ما شابه من الأنشطة الأخرى التي تتطلب شدة الملاحظة. وعليك في الوقت نفسه أن تتجنب تعاطي المشروبات الكحولية والأدوية المنومة (بنسوديازيبين)؛ لأنها تزيد من احتمال الإصابة بأعراض جانبية خطيرة.

إنهاء العلاج في الوقت المناسب

ننصح العلاج أكثر من أسبوعين تقريبًا، فسيكون هناك احتمال في أن تشعر مثل: اضطراب النوم وكثرة التثاوب وسيلان اللعاب إلى أنك إذا المتناع، إل أن هذا

بأعراض مزعجة عند التوقف عن العلاج، الأنف وتوسع حدقة العين والتضخيمية والغثاس. وهذه هي أعراض أصبحت حينًا على الدواء. وذلك لتفق مع

طبيبك هذا خروجك من الأدوية التي تحتوي على أوبيويد لفترة المتناع ال يعني أنك وتصبح بحاجة إلى زيادة المستشفى على كيفية إنهاء العلاج. وعند العلاج طويلة،

فإن الجسم يعتاد على الدواء ليزداد تحمل الجسم لها.)

طبيبك نفس التأثير الذي كنت تحصل عليه سابقًا. وقد يؤدي ذلك إلى إيمانك الجرعة

جسديًا ونفسيًا على ذلك.

بالمخاطر المنكورة أعلاه، فإنه من المهم جدًا أن تتناول دواءك حسب إرشادات وأل تزيد من الجرعة من تلقاء نفسك أو

تتناول الدواء لفترة أطول مما اتفقت عليه الحد الألم لديك بعد فترة العلاج المنقط لها، يجب عليك أن تتصل الطبيب مع الطبيب. وفي حال

استمر

بطبيبك من أجل التشاور معه.

الحمل / الرضاعة

فالمهم أن تخبري طبيبك بذلك قبل بدء العلاج. مرضعًا،

لنقته حاملًا أو