

Rekommendationer vid brist på vaccin mot hepatit A

Bakgrund

Det har periodvis varit brist på både Havrix och Vaqta i Sverige. Ett förslag på vaccinering när monovalent hepatit A-vaccin ej finns tillgängligt har därför tagits fram.

Vaccinationsrekommendationer

Som alltid behöver bedömningen av vaccinationsbehovet individualiseras beroende på resenär och resmål. Om individen har behov av hepatit A-skydd, men tidigare fått en eller flera doser hepatit B-vaccin, får man nu bortse från att hepatit B-vaccin givits. Samma råd gäller de individer som har kronisk hepatit B virusinfektion. Att ge en eller flera doser hepatit B-vaccin i onödan skadar inte, men det ger en merkostnad för patienten. Tills vidare rekommenderas följande:

1. **Barn i åldrarna 6-12 månader:** Sällan behov av vaccination mot hepatit A. Vid hög risk för hepatit A-smitta ges i första hand monovalent hepatit A-vaccin om tillgängligt, annars Ambirix "off-label".
2. **Barn i åldrarna 1-15 år:** Ge en dos Ambirix före resan. Om barnet tidigare är vaccinerat mot hepatit B, informera om övervaccinering och ge endast vaccin mot hepatit A som påfyllnadsdos 6-12 månader senare.
3. **Personer från 16 års ålder:** Välj ett av nedanstående alternativ. Informera om eventuell övervaccinering mot hepatit B. Om individen tidigare är vaccinerad mot hepatit B, ge endast vaccin mot hepatit A som påfyllnadsdos efter 6-12 månader.
 - A. **Enkeldos Twinrix** ges vid 0+1+6 månader. Två doser Twinrix bör ges före avresan för fullgott skydd mot hepatit A.
 - B. **Snabbvaccination** med **enkeldos Twinrix** ges i 3 doser före avresan: dag 0+7+21 och en påfyllnadsdos efter 1 år.
 - C. **Dubbeldos av Twinrix** (en dos i vardera armen) ges om planerad avresa sker inom 3 veckor från vaccinationsstart. Fyll på med en dos vaccin mot hepatit A efter 6-12 månader eller två doser Twinrix efter 1 och 6 mån om även hepatit B skydd önskas.

Gammaglobulin ges enbart till de som ej förväntas svara på hepatit A-vaccination eller där kontraindikationer för hepatit A-vaccination föreligger. Observera att det ibland råder brist på gammaglobulin och därför bör gammaglobulin helst sparas för användning vid utbrottssituationer.

För terapigrupp Vaccin

Marianne Jertborn och Susanne Woxenius

2017-05-31