

معلومات للمرضى

تسري ابتداء من 2022/06/05

المعالجة الموضعية باستخدام حمض الترانيكساميك (سيكلوكابرون (Cyklokapron)

تتم معالجتك باستخدام دواء مخفف لتخثر الدم ولذلك فيمكن أن يلزم استخدام حمض الترانيكساميك tranexamsyra (سيكلوكابرون (Cyklokapron) للمعالجة الموضعية بعد جراحة أسنانك وذلك لتقليل احتمال حدوث النزيف.

حمض الترانيكساميك

عن طريق العض على ضمادة مبللة تم غمسها في محلول ترانيكساميك (سيكلوكابرون) بعد جراحة أسنانك تزداد قدرة تخثر الدم موضعيا في تجويف الفم، بدون زيادة خطر تطور جلطات دموية في باقي أجزاء الجسم.

قبل العملية الجراحية:

إذا كنت تعالج باستخدام الوارفارين (فاران (Waran) فيجب أن تكون هناك قيم حديثة لزمن البروثرومبين PK (النسبة المعيارية الدولية INR). يتم أخذ عينة الفحص في اليوم السابق لجراحة الأسنان، أو في صباح يوم المعالجة.

في حالة حدوث نزيف بسيط بعد الجراحة:

- تجنب المضغ أو تنظيف الأسنان بالفرجون على المنطقة التي تمت المعالجة فيها وذلك طوال فترة الالتئام (من المعتاد 1 - 2 أسبوع بعد الجراحة).
- عند الحاجة إلى دواء مخفف للأوجاع اسأل طبيب الأسنان ما هو المستحضر المناسب لك بالذات.
- يذوب قرص سيكلوكابرون الفوار في 10 مليلتر (ملعقتي شاي) من الماء. اغمس الضمادة في المحلول وضع الضمادة على المنطقة المُعالجة وعضّ عليها لمدة 30 - 60 دقيقة). يمكن أن يتم تكرار هذا الشيء عند الحاجة 3 - 4 مرات في اليوم خلال 1 - 3 أيام بعد الجراحة حسب إرشادات طبيب الأسنان.
- إذا لم يساعدك ذلك تواصل مع طبيب أسنانك . إذا كانت عيادة الأسنان مغلقة اتصل بمركز معلومات الرعاية الطبية على الرقم 1177.

هل توجد لديك أسئلة؟

تواصل مع طبيب أسنانك.

طبيب الأسنان:

رقم الهاتف: