

اطلاعاتی برای بیمار

تاریخ اعتبار از: ۵ مه ۲۰۲۲

درمان موضعی با ترانکزامیک Tranexamic اسید (سیکلوکاپرون Cyklokapron)

شما تحت درمان با داروهای رقیق کننده خون هستید و بنابراین ممکن است استفاده از ترانکزامیک اسید (سیکلوکاپرون) برای درمان موضعی پس از عمل دندانپزشکی برای کاهش خونریزی احتمالی مناسب باشد.

ترانکزامیک اسید

با گاز گرفتن کمپرس آغشته به محلول ترانکزامیک اسید (سیکلوکاپرون) پس از جراحی دندان، توانایی لخته شدن خون به صورت موضعی در حفره دهان زیاد می شود بدون اینکه خطر تشکیل لخته خون در بقیه بدن افزایش یابد.

قبل از عمل:

اگر تحت درمان با وارفارین (واران Waran) هستید، باید رقم پایه پروترومبین کامپلکس یا PK (INR) تازه ای در دسترس باشد. نمونه گیری برای بدست آوردن رقم پایه، یک روز قبل از عمل دندانپزشکی یا صبح روز عمل انجام می گیرد.

در صورت خونریزی جزئی بعد از عمل:

- از جویدن در ناحیه تحت درمان یا مسواک زدن آن در طول فرآیند بهبودی (معمولاً ۱ تا ۲ هفته پس از عمل) خودداری کنید.
- اگر به مسکن نیاز دارید، از دندانپزشک بپرسید که کدام دارو برای شما مناسب است.
- ۱ قرص جوشان سیکلوکاپرون را در ۱۰ میلی لیتر (۲ قاشق چایخوری) آب حل کنید. یک کمپرس را در محلول خیس کنید و آن را در ناحیه تحت درمان قرار دهید و به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه روی آن گاز بزنید. این کار را می توان در صورت لزوم ۳ تا ۴ بار در روز به مدت ۱ تا ۳ روز پس از عمل طبق دستور دندانپزشک تکرار کرد.
- اگر این کار کمکی نکرد، با دندانپزشک خود تماس بگیرید. در صورت تعطیلی کلینیک دندانپزشکی با شماره تلفن 1177 با اطلاعات خدمات بهداشتی و درمانی Sjukvårdsupplysningen تماس بگیرید.

آیا پرستی دارید؟

با دندانپزشک خود تماس بگیرید.

دندانپزشک:

تلفن: