

## معلومات للمرضى عن الدواء المهدئ عند معالجة الأسنان

يعطى الدواء (ميدازولام Midazolam) قبل بدء معالجة الأسنان بحوالي 20 دقيقة لتخفيف القلق والخوف. كما أن له فعالية مهدئة تخفف الشد العضلي ويمكن أن تؤثر فعاليته على توازن الانسان، ولذلك فمن المهم أن يفكر الانسان بهذا التأثير بعد المعالجة.

إن ذكرى المعالجة لا تكون في الحالات العادية واضحة تماما لأن الدواء يؤثر أيضا على الذاكرة. يشعر الأطفال أحيانا بالحزن خلال المعالجة وبعدها بالرغم من تعاطي الدواء. من المهم أن يعطي الإنسان صورة ايجابية لتسلسل الأحداث قبل المعالجة لأن هذا الشيء هو الذي يبقى في ذاكرة الطفل.

### تعاطي الطعام

تعاطى طعاما خفيفا قبل المعالجة بساعتين.  
(تجنب فاكهة الكريب فروت)

### بعد المعالجة

يبقى تأثير الدواء في جسم الإنسان بضعة ساعات. في أغلب الأحيان يتوجب على المرء أن يبقى في العيادة خلال فترة لا تقل عن ساعة واحدة بعد المعالجة.

### الشخص البالغ

إن قيادة السيارات ممنوعة تماما خلال 12 ساعة بعد المعالجة.  
يجب على الشخص البالغ أن يكون لديه مساعد دليل عند مغادرة العيادة إلى المنزل.

### الأطفال

عند السفر إلى المنزل بالسيارة فيجب أن يجلس الطفل كالمعتاد في كرسي الأطفال أو أن تقوم بشد حزام الأمان على جسده وأن يجلس شخص بالغ بجانبه. إذا نرس الطفل ونام فيجب أن يكون جسده في وضع الانطراح على جانبه. يجب تجنب اللهو في الهواء الطلق وركوب الدراجات والتسلق.

إذا كانت لديك أي تساؤلات بهذا الخصوص فلا تتوانى عن التواصل هاتفيا مع:

.....  
.....