

Information om lugnande medicin vid tandbehandling



v. 2012

BKS

Informacije o leku za smirenje prilikom zubarskog tretmana

Lek (Midazolam) se daje od prilične 20 minuta pre zubarskog tretmana kako bi se ublažili uznemirenost i strah. Lek isto tako ima opuštajuće dejstvo na muskulaturu i može uticati na ravnotežu, na šta treba обратити pažnju čak i nakon završenog zubarskog tretmana. Sećanje na zubarski tretman obično nije sasvim razgovetno zato što lek utiče na sposobnost kratkoročnog pamćenja. Deca su ponekad plaćljiva u toku ili posle zubarskog tretmana uprkos navedenom mediciniranju. Važno je pružiti pozitivnu sliku celokupnog procesa zato što je ta slika ono što dete pamti!

Uzimanje hrane

Pojedi neku lakšu hranu 2 sata pre zubarskog tretmana. (Izbegavaj djus od grejpfrukta!)

Posle zubarskog tretmana

Efekat ovog leka je prisutan u telu tokom nekoliko sati. Stoga se naječešće preporučuje ostajanje na klinici najmanje 1 sat posle zubarskog tretmana.

Odrasli

Vožnja automobila **nije** dozvoljena u toku 12 sati nakon zubarskog tretmana. Odrasli treba da imaju pratnju na putu od klinike do kuće.

Deca

Pri automobilskoj vožnji kući, dete treba da sedi kao i obično u dečijoj automobilskoj stolici ili vezano pojasom na sedištu automobila a jedna odrasla osoba treba istovremeno da sedi pored deteta. Dete treba držati pod direktnim nadzorom jedne odrasle osobe u toku nastavka dana. Ukoliko dete zaspie, treba da leži na strani. Treba izbegavati igranje napolju, vožnju biciklom i planinarenje.

Ukoliko želite da postavite pitanja pozovite:

.....

.....