

为患者提供的信息

自 2022 年 5 月 6 日起适用

使用氨甲环酸 (传明酸) 进行局部治疗

由于您接受通过血液稀释剂进行的治疗，您将会在牙医治疗后使用氨甲环酸 (传明酸) 进行局部治疗，藉此减少可能的出血。

氨甲环酸

您可通过在牙医治疗后咬住一块裹着氨甲环酸 (传明酸) 的断血炎胶囊，提高口腔中局部区域血液的凝固力；同时，此举不会增加身体其他部位出现血栓的风险。

治疗前的注意事项：

如果您接受华法林 (又称华法令) 治疗，必需取得最新的 PK(INR) 数值 (即凝血酶原复合物国际标准化比值)。请在牙医治疗的前一天、或治疗日的当天早上进行采检。

治疗后的小幅度出血：

- 在复原过程期间 (通常为治疗过后的 1 至 2 周内)，请避免以牙刷刷动受治疗的区域或以该区域咀嚼。
- 如果您需要止痛药，请向牙医师询问、了解哪一种配方或调剂适合您的情形。
- 请将1片传明酸泡腾片溶解在 10 毫升 (相当于2茶匙) 的水中。将一片胶囊浸入该溶液中；随后，再将该片胶囊固定在受治疗的区域上，并咬住它、持续30至60分钟。可视情况需要，依据牙医师的指示在治疗过后的1至3日内，每日重复3至4次。
- 如果上述措施均不见效，请联系您的牙医师。如果牙医诊所未上班，请拨打医疗体系的咨询专线 (电话号码: 1177)。

您是否还有其他问题？

请与您的牙医师联系。

牙医师:

电话: