

Информация для пациентов

Действует с 06.05.2022

Местная обработка транексамовой кислотой (Суклокаргон, Циклокапрон)

Вы принимаете препараты, разжижающие кровь. Поэтому, чтобы уменьшить возможное кровотечение после стоматологического вмешательства, может возникнуть необходимость применения транексамовой кислоты (Суклокаргон, Циклокапрон) для местной обработки.

Транексамовая кислота

Если после стоматологического вмешательства зажать зубами компресс, пропитанный раствором транексамовой кислоты (Суклокаргон, Циклокапрон), тогда повышается свертываемость крови локально в ротовой полости, при этом риск возникновения кровяных тромбов в остальных частях тела не увеличивается.

Перед стоматологическим вмешательством:

Если вы принимаете варфарин (Waran, Варан), необходимы свежие показатели протромбированного комплекса (PK (INR)-värde). Анализы следует сдать за день до вмешательства или утром в день проведения вмешательства.

В случае незначительного кровотечения после вмешательства:

- Во время процесса заживления (как правило 2-3 недели после вмешательства) избегайте жевать на той части и чистить щеткой ту часть ротовой полости, где было проведено стоматологическое вмешательство.
- Если вам необходимы обезболивающие, спросите стоматолога, какие препараты вам подходят.
- Растворите 1 шипучую таблетку Циклокапрона (Суклокаргон) в 10-ти мл (2 чайные ложки) воды. Смочите компресс раствором, приложите к той части, где было проведено вмешательство, и зажмите зубами на 30-60 мин. При необходимости это можно повторять 3-4 раза в день в течение 1-3 дней после вмешательства, как предписано стоматологом.
- Если это не помогает, обратитесь к своему стоматологу. Если стоматологическая клиника закрыта, звоните в медицинскую консультацию по телефону 1177.

У вас есть вопросы?

Обратитесь к своему стоматологу.

Стоматолог:

Телефон: