

# Інформація для пацієнтів

Діє з 06.05.2022

## Місцеве лікування транексамовою кислотою (Циклокапроном)

Ви проходитье лікування препаратами, що розріджують кров, і тому може бути доцільно використовувати транексамову кислоту (Циклокапрон) для місцевого лікування після стоматологічної процедури, щоб зменшити можливу кровотечу.

### Транексамова кислота

Накладання компресу, змоченого в розчині транексамової кислоти (Циклокапрону), після стоматологічної процедури збільшує здатність крові до згортання локально в порожнині рота, не збільшуючи ризик утворення тромбів в інших частинах тіла.

### Перед процедурою:

Якщо ви приймаєте варфарин (Waran), ви повинні мати свіжі показники РК(INR). Аналіз слід здати за день до стоматологічної процедури або вранці в день процедури.

### При незначній кровотечі після процедури:

- Під час процесу загоєння (зазвичай 1-2 тижні після процедури) намагайтесь не жувати місцем проведення процедури і не чистити щіткою цю ділянку.
- Якщо вам потрібно знеболююче, запитайте свого стоматолога, який препарат підходить саме вам.
- 1 шипучу таблетку циклокапрону розчиніть в 10 мл (2 ч.л.) води. Змочіть компрес у розчині, прикладіть компрес до ділянки, де проводилась процедура, і прикусіть його на 30-60 хвилин. У разі необхідності можна повторювати 3-4 рази на день протягом 1-3 днів після процедури, відповідно до інструкцій стоматолога.
- Якщо це не допоможе, зверніться до свого стоматолога. Якщо стоматологічна клініка закрыта, зателефонуйте до медичної інформаційної служби за номером 1177.

### Виникли питання?

Зверніться до свого стоматолога.

Стоматолог: .....

Телефон: .....