

Information sur les sédatifs pris à l'occasion des traitements dentaires

Le médicament (Midazolam) est administré près de 20 minutes avant le traitement dentaire afin de diminuer la peur et l'inquiétude. Il a aussi pour effet de décontracter la musculature et peut agir sur l'équilibre, ce à quoi il faudra penser après le traitement.

En général, le souvenir du traitement n'est pas très précis, parce que le médicament affecte la capacité de mémoire.

Malgré l'administration du médicament, il arrive que les enfants soient tristes pendant et après le traitement. Il est important de leur donner une image positive du déroulement des faits, puisque c'est cela que l'enfant se rappellera!

Prise d'aliments

S'alimenter de manière légère 2 heures avant le traitement. (pas de jus de pamplemousse)

Après le traitement

Les effets du médicament demeurent dans le corps pendant plusieurs heures. Souvent, il faudra donc rester à la clinique pendant au moins une heure après le traitement.

Adultes

La conduite d'un véhicule **n'est pas** autorisée pendant les 12 heures qui suivent le traitement. Les adultes doivent se faire accompagner en rentrant de la clinique.

Enfants

Lorsque le retour de la clinique se fait en voiture, l'enfant doit être assis dans son siège pour enfant ou avec une ceinture de sécurité, comme d'habitude, et un adulte assis à côté de lui. Pendant le reste de la journée, l'enfant doit rester sous la surveillance d'un adulte. Si l'enfant s'endort, il doit être allongé sur le côté. Jeux à l'extérieur, bicyclette et escalades à éviter.

En cas de question, appeler :

.....

.....