

## Agahdarî liser dermansistker di tedavîya dirana de

Dayîna dermanê (Midazolam) dirana bi kasî 20 deqika berî lînêrînê ye, ji bo nearamî û tirsê kêr bike. Herveha dikare tesîra xwe liser sistbûna sîstema adala (masûlkan) û balansê (hevsengî) bihêle, herveha vîna piştî tedavîyê ji bifikirin.

Bi piranî piştî tedavîye hîş ne zelale ji ber kû derman tesîrê liser kapasîta (şîyan) bibîranînê dike. Tevlî derman dayinê zarok carna di dema an jî piştî tedavîyê xemginin. Gelek girînge mirov li ser ve herkabûyera pêvajoyê sûretekî erênî (positiv) bide, ji ber vê ev dêm ê bê bîra zarok!

### Xwarin û vexwarin

2 seat berî lînêrînê xwarinê sivik bigre. (ne ava grayfurtê)

### Piştî tedavîyê

Hêza derman çend seat di laş de dimînin. Ji bo vê gelek cara piştî tedavîyê mirov herî kêr 1 seat di klînîkê de dimîne.

### Mezin

Piştî tedavîyê ajotina trimbêlê 12 seat ne serbeste. Ji klinikê çûna mezin ber bi mal ve divê yek pêre be.

### Zarok

Revîtiya trimbêlê ber bi malê ve divê zarok normal bi kayîşa parastinê an jî li ser kursî rûnê û mezinek li tenîştayê vî be. Lazime hemû roj zarok di bin kolaçaniya mezinek de be. Eger zarok di xwev re çû divê liser ênişkê be. Ji leyistikê derveyî malê, vek bisîklêt û hilkişandinê dûrkeve.

*Eger pirsê te hebe telefon bike:*

.....

.....