

## اطلاعات در مورد داروی آرام بخش در طول درمان دندان

داروی آرام بخش 20 (Midazolam) دقیقه قبل از درمان مریض در دندانسازی برای آرام کردن نگرانی و تشویش بکار میرود. همچنین تاثیر آن برای آرام کردن عضله و بالانس بدن که باید در طول زمان در نظر گرفت.

حافظه در طول زمان درمان واضح نمی باشد به خاطر اینکه دارو اثر میگذارد. کودکان در زمان قبل و بد درمان غمگین و ناراحت میشوند. خیلی مهم میباشد که در طول درمان خاطره خوب بسازید تا وقتی به حالت عادی بر می گردن را به یاد بیاورند.

### مصرف مواد غذایی

در نظر داشتن مواد غذایی ساده 2 ساعت قبل درمان.  
(عصاره گریپ فروت)

### بد درمان

تاثیر مصرف درمان دارو چندین ساعت در بدن میماند. گاهی لازم است حداقل 1 ساعت باید در درمانگاه نگهداری شوند.

### بزرگسالان

اجازه رانندگی کردن ندارید حداقل 12 ساعت بعد از مصرف دارو اجازه راندن ندارید. بزرگسالان حتما باید یک همراه داشته باشند در برگشت به خانه از KLINIKEN.

### کودکان

در زمان برگشت به خانه باید از صندلی و کمربند ایمنی استفاده شود با داشتن همراه حتی در طول روز. و در موقع خوابیدن کودک باید به پهلو قرار گیرد و از بازی در بیرون خانه و چرخ سواری بالا پریدن خوداری شود.

اگر سوال دارید زنگ بزن.

.....

.....