

Informacja o środkach uspokajających przy zabiegach stomatologicznych

Lek (Midazolam) jest podawany około 20 minut przed zabiegiem w celu opanowania niepokoju oraz strachu. Działa również rozluźniająco na mięśnie w wyniku czego może zaburzać równowagę – należy pamiętać o tym po zabiegu. Pamięć po zabiegu będzie również delikatnie zaburzona.

Dzieci wykazują czasami uczucie smutku podczas zabiegu lub zaraz po nim.

Ważne jest aby przedstawić dziecku w pozytywny sposób całe zdarzenie ponieważ dziecko w taki własnie sposób zapamięta całe wydarzenie!

Przed zabiegiem

Dwie godz. przed zabiegiem należy spożywać tylko lekki pokarm, (żadnych soków owocowych)

Po zabiegu

Lekarstwo pozostaje w ciele jeszcze kilka godzin po zabiegu. Najczęściej musi pacjent zostać w klinice najmniej 1 godzinę po zabiegu.

Dorosli

Prowadzenie samochodu jest zabronione w ciągu 12 godzin po zabiegu. Dorosli powinni mieć opiekę drugiej osoby w drodze powrotnej do domu /po zabiegu/.

Dzieci

W drodze powrotnej do domu dziecko powinno siedzieć w foteliku samochodowym lub przypięte pasami bezpieczeństwa oraz mieć dorosłą osobę w pobliżu. Dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej po zabiegu. Jeśli dziecko będzie spało należy położyć je na boku. Dziecko powinno unikać : zabaw poza domem, jazdy na rowerze oraz wspinania się.

Jesli masz pytania, zadzwoń:

.....

.....