

Antimykotikaval vid invasiv candidainfektion

Fastställd januari 2025 av Läke-medelskommittén i Västra Götalandsregionen. Giltig t.o.m. januari 2027.

Invasiv candidainfektion är en svårdiagnostiserad komplikation som behöver övervägas i många situationer. Empirisk behandling kan bli aktuell och olika preparat finns tillgängliga.

Val av echinokandin

- Echinokandinerna (kaspofungin, anidulafungin och mikafungin) bedöms som likvärdiga ur effekt- och biverkningssynpunkt.
- Beakta aktuellt pris, godkända indikationer, kontraindikationer samt eventuell interaktionsproblematik vid val av echinokandin.
- I första hand rekommenderas kaspofungin utifrån ett kostnadsperspektiv, se nedan.
- Anidulafungin är den enda echinokandinen som inte behöver dosjusteras vid kraftigt nedsatt leverfunktion.
- Kaspofungin är den enda echinokandinen som är godkänd för empirisk behandling av troliga svampinfektioner hos neutropena patienter med feber.
- Mikafungin är den enda echinokandinen som är godkänd för profylax mot Candida-infektion.

Val av flukonazol

- Flukonazol kan användas som empirisk behandling till patienter som ej är immunsupprimerade eller allvarligt sjuka och där infektion med candidaart känslig för flukonazol misstänks.
- För patienter som initialt behandlats med en echinokandin rekommenderas byte till flukonazol då tillståndet är stabilt och odling visat candidaart känslig för flukonazol.

Prisjämförelse per dygn, rekvisition (baserat på priser från 1 februari 2025)		
Caspofungin Tillomed (kaspofungin)	50 mg	249,15 kr
	70 mg	381,03 kr
Mycamine (mikafungin)	50 mg	425 kr
	100 mg	495 kr
Ecalta (anidulafungin)	100 mg	684 kr
Fluconazol Fresenius Kabi	400 mg, i.v.	53 kr
Fluconazol Krka	400 mg, p.o.	ca 25 kr

Priserna avser avtalspriser och gäller tom:

2026-01-31: (Caspofungin Tillomed, Fluconazol Fresenius Kabi, Fluconazol Krka)

2027-01-31: (Mycamine, Ecalta)

Referenser

1. IDSA:s behandlingsriktlinjer
2. Fass