

Brist på alfakalcidol

Giltig fr.o.m. 2023-03-16

Vid brist på kapsel innehållande alfakalcidol kan nedan behandlingsalternativ övervägas.

Behandlingsalternativ

Hypokalcemi vid kronisk njursjukdom är ofta lätt-måttlig och utan symtom. De allra flesta patienter med kronisk njursvikt (CKD) stadium 3–4 (GFR 15–60 ml/min) klarar sig utan alfakalcidol i minst några veckor. Ett kortare uppehåll medför sällan symtomgivande hypokalcemi. Patienter med CKD stadium 5 och patienter med lägre utgångsvärden har störst risk för mer uttalad hypokalcemi.

Till patienter med CKD stadium 3 (GFR 30–60 ml/min) kan byte till kolekalciferol (vanligt D-vitamin) övervägas.

Till patienter med CKD stadium 4 och 5 kan byte från alfakalcidol till kalcitriol (Rocaltrol) vara ett alternativ, men kräver uppföljande kontroller.

Vid hypokalcemi kan insättning/dosökning av kalciumkarbonat övervägas.

Se också REKlistan kapitel Njurar, [Sekundär hyperparathyreoidism vid kronisk njursjukdom](#)

Kalcitriol (Rocaltrol)

Vid byte från alfakalcidol till kalcitriol (Rocaltrol) kan i många fall samma dos ges men individuellt övervägande krävs då Rocaltrol tenderar att vara något mer potent. Rocaltrol saknar text i FASS, se [SmPC här](#). Rocaltrol kan inte dosdispenseras.

Övriga läkemedel som innehåller alfakalcidol

Orala droppar Etalpa 2 µg/ml (förmån)

Injektionsvätska Etalpa 2 µg/ml (ej förmån)

Licensalternativ

För licensalternativ innehållandes alfakalcidol och förskrivning av licensläkemedel på recept, [se mer information från Sortimentsrådet](#).