

Información acerca de sedantes en el tratamiento dental

El medicamento (Midazolam) se toma aproximadamente 20 minutos antes del tratamiento odontológico para reducir la angustia y el miedo. Afecta también en la relajación muscular y puede afectar el equilibrio, esto se debe tener en cuenta después del tratamiento.

El recuerdo referente al tratamiento no suele ser muy claro debido a que la medicina afecta la capacidad para recordar. Los niños están a veces tristes durante o después del tratamiento a pesar de la medicación.

Es importante ofrecer una imagen positiva de los acontecimientos, ya que es lo que el niño va a recordar!

Ingesta de comida

Tome comidas ligeras dos horas antes del tratamiento. (No zumo de pomelo)

Después del tratamiento

El efecto del fármaco permanece en el cuerpo durante varias horas. Con frecuencia debido a esto puede permanecer en la clínica al menos 1 hora después del tratamiento.

Adultos

La conducción **no** está permitida dentro de las 12 horas después del tratamiento. Los adultos deben tener un acompañante en su camino a casa desde la clínica.

Niños

En el viaje de vuelta en coche, el niño debe sentarse como de costumbre en el asiento de seguridad o hacer uso del cinturón de seguridad y tener a un adulto a su lado. El niño debe estar bajo vigilancia el resto del día por un adulto. Si el niño se queda dormido debe acostarse de lado. Juegos al aire libre, ciclismo y escalada deben evitarse.

Si usted tiene preguntas, por favor llame a:

.....

.....