

Diş tedavisinde sakinleştirici hakkında bilgi

İlaç (Midazolam) kaygı ve korkuyu azaltmak için diş tedavisinden yaklaşık 20 dakika önce verilir. Bu ilaç kasları gevşediği gibi balansı da etkiler ki, tedavi sonrası düşünülmesi gereken önemli bir unsurdur. Kullanılan ilaç hatırlama yeteneğini etkilediğinden normal şartlarda tedavi anı net bir şekilde hissedilmemektedir.

İlaca rağmen çocuklar bazen tedavi sırasında veya sonrasında tedirgin olabiliyor. Dolayısıyla olay süreciyle ilgili olumlu bir görüntü vermek çok önemlidir, bu da çocukların hatırlama yeteneğini etkiler!

Gıda alımı

Tedaviden iki saat önce hafif yiyecek alın.
(greyfurt suyu olmasın)

Tedavi sonrası

İlacın etkisi birkaç saat boyunca vücutta kalır. Genellikle tedavi sonrasında en az 1 saat daha klinikte kalmak gerek.

Yetişkinler

Tedaviden sonra 12 saate kadar araç sürmek yasaktır. Yetişkinler klinikten ayrılırken eskort eşliğinde eve gitmeli.

Çocuklar

Araba ile dönüş yolculuğu, çocuk araba koltuğu ve emniyet kemeri kullanarak her zamanki gibi oturup yanlarında bir yetişkin olması gerekir. Çocuğun bir yetişkin tarafından günün geri kalanında denetlenmelidir. Çocuk uykuya düşerse, yan bir şekilde yatmalıdır. Açık alanlarda oynaması, bisiklet sürmesi ve tırmanması kaçınılmalıdır.

Sorularınız varsa lütfen arayın:

.....
.....