

Warbixin bukaan

Giltig fr.o.m. 2022-05-06

Daawayn si maxalli ah loogu daawaynayo tranexamsyra (Cyklokapron)

Waxaa lagu daawaynayaa daawo dhiigga khafiifisa waxaana sidaas darteed dhici karta inaan isticmaalno tranexamsyra (Cyklokapron) si maxalli ah qalliinka iligga kaddib si loo yareeyo dhiigbaxa ka dhalan kara.

Tranexamsyra

Ayadoo la qaniino suuf lasoo dhex geliyay daawada tranexamsyra (Cyklokapron) la qasay qalliinka iligga kaddib ayaa waxaa kordhaya awoodda xinjirowga dhiigga oo afka gudhiisa ku eg (maxalli ah), iyadoo aysan jiri doonin halis inay xinjiro dhiig ah ka dhashaan jirka intiisa kale.

Qalliinka ka hor:

Haddii lagu daaweeyay warfarin (waran) waa inuu jiro cabbir cusub ee heerka PK(INR). Tijaabada waxaa la qaadayaa maalinta ka horraysa maalinta qalliinka iligga, ama maalinta daawaynta (qalliinka) subaxdeeda.

Markii uu jiro dhiigbax yar qalliinka kaddib:

- Iska ilaali inaad wax ku calalisid ama cadaydid agagaarka iligga la daaweeyay muddada buskoodku ku socdo (1-2 asbuuc qalliinka kaddib).
- Haddii loo baahdo xanuun baabi'in, weydii dhakhtarka daawada adiga kugu haboon adiga.
- Kaniiniga biyaha ku dhex burbura ee Cyklokapron waxaa lagu qasaa biyo 10 ml (2 ts) ah. Suufka dhex geli daawada qasan oo dulsaar suufka meesha la daaweeyay oo qaniin 30-60 daqiiqo. Waxaa taas lagu celcelin karaa haddii loo baahdo 3-4 jeer habeen iyo maalin (24 saac) 1-3 habeen iyo maalmood qalliinka kaddib, sida uu kugu qoro dhakhtarka ilkaha.
- Haddii aysan taas ku caawin, la xiriir dhakhtarkaaga ilkaha. Haddii rugta daryeelka ilkaha ay xiran tahay, ka wac Xarunta warbixinta daryeelka caafimaadka telefoon lambarka 1177.

Su'aalo ma qabtaa?

La xiriir dhakhtarkaaga ilkaha.

Dhakhtarka ilkaha:

Telefoon: