

Patientinformation

Fastställd juni 2026 av Läke-medelskommittén i Västra Götalandsregionen. Giltig t.o.m. juni 2028.

Lokal behandling med tranexamsyra (Cyklokapron)

Du behandlas med blodförtunnande läkemedel och det kan därför bli aktuellt att använda tranexamsyra (Cyklokapron) för lokal behandling efter ditt tandingrepp för att minska eventuell blödning. Om du har fått recept på Cyklokapron ska detta hämtas ut i anslutning till behandlingen.

Tranexamsyra

Genom att bita på en kompress indränkt med tranexamsyralösning (Cyklokapron) efter tandingreppet ökar blodets levringsförmåga lokalt i munhålan, utan att ge ökad risk för bildning av blodproppar i resten av kroppen.

Före ingreppet

Om du behandlas med warfarin (Waran) ska ett färskt PK(INR)-värde finnas. Prov tas dagen före tandingreppet eller behandlingsdagens morgon.

Att tänka på efter ingreppet

- Undvik att tugga eller borsta mot det behandlade området under läkningsprocessen (vanligen 1–2 veckor efter ingreppet).
- Vid behov av smärtstillande, fråga tandläkaren vilket preparat som är lämpligt för just dig.

Vid blödning efter ingreppet:

1 Cyklokapron brustablett löses upp i 10 mL (2 tsk) vatten. Dränk in en kompress med lösningen och lägg kompressen mot det behandlade området och bit på den i 30–60 minuter. Detta kan upprepas vid behov 3–4 gånger per dygn i 1–3 dygn efter ingreppet.

Utebliven effekt

Om blödningen inte upphör, ta kontakt med din tandläkare. Om tandklinikens är stängd, ring Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Har du frågor?

Kontakta din tandläkare.

Tandläkare: _____

Telefon: _____