

losartan	Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid
eprosartan	Teveten/Comp
valsartan	Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto
irbesartan	Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea
kandesartan	Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesartan, Candesartan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,
telmisartan	Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi
Läkemedel mot diabetes	
metformin	Metformin, Comptact, Eucras, Glucophage, Janumet, Jentaduetto, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo
empagliflozin	Jardiance, Synjardy, Glyxambi
kanagliflozin	Invokana, Vokanamet
dapagliflozin	Forxiga, Xigduo, Qtern
ertugliflozin	Steglatro, Segluromet, Steglujan
Annat läkemedel	

Smärtstillande läkemedel i gel- eller sprayform går bra att använda.
Tabletter och flytande läkemedel med paracetamol (Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin) går också bra att använda.

Överskrid aldrig rekommenderade doser!

Till dig som medicinerar med

LÄKEMEDEL

**med risk för allvarliga biverkningar
vid akuta tillstånd med vätskebrist**

- *diarréer*
- *kräkningar*
- *hög feber (över 38 °C)*
- *värmebölja*
- *akut sjukdom med svårigheter att äta eller dricka*

Vissa av de läkemedel som används mot hjärtsjukdomar, högt blodtryck, smärta och diabetes kan ge allvarliga biverkningar om de används när kroppens vätskebalans är i oordning.

Kom ihåg:

Det finns risk för allvarlig biverkan av dessa läkemedel vid tillstånd med vätskebrist såsom kräkning, diarré, feber, stark värme eller tillstånd som gör att du inte kan äta eller dricka. Risken för allvarlig biverkan ökar vid hög ålder eller nedsatt njurfunktion.

Hur skall man agera vid vätskebrist?

Om du medicinerar med något av de nämnda läkemedlen bör du göra uppehåll i din behandling i situationer där vätskebrist kan föreligga. Om besvären inte är bestående kan behandlingen påbörjas igen direkt då besvären har gått över.

Kontakta sjukvården vid tveksamhet!

.....

Du behandlas med:

Smärtstillande läkemedel		
	diklofenak	Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte
	piroxikam	Brexidol
	tenoxikam	Alganex
	meloxicam	Meloxicam
	ibuprofen	Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin
	naproxen	Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo
	ketoprofen	Orudis/Retard
	dexibuprofen	Tradil
	dexketoprofen	Enantyum, Ketesse
	celecoxib	Celebra, Celecoxib
	etoricoxib	Arcoxia, Etoricoxib
	nabumeton	Relifex
Vätskedrivande läkemedel		
	bendroflumetiazid	Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite
	hydroklortiazid	Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hydroklortiazid
	klortalidon	Hygropax
	metolazon	Metolazon
	furosemid	Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard
	bumetanid	Burinex
	torasemid	Torasemid, Torem
	spironolakton	Spironolactone, Spironolakton
	eplerenon	Eplerenon, Inspra
	amilorid	Amilorid
Läkemedel mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck		
	digoxin	Digoxin, Lanoxin
	kaptopril	Captopril
	enalapril	Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp
	lisinopril	Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid
	perindopril	Coversyl Novum
	ramipril	Ramipril, Triatec, Ramipril/Hydroklorotiazid
	fosinopril	Fosinopril
	kinapril	Accupro Comp