

معلومات برای شما که در هنگام درد
عاجل، با ادویه مرکبات افیونی (تریاک)
درمان می شوید



Information till dig som får behandling
med opioid för akut smärta

Terapigrupp Smärta, april 2018

در موقع مناسب به پایان برسانید که هر گاه شما یک دوره ی تداوی برای دبت

درازتر از **تویا** ً **یو فک** که در هنگامی که شما دوره انویه را به پایان می‌به خطر داشته باشید داشته باشید، این خطر وجود خواهد داشت خطراته‌های (ناخوشایندی به شما دست بدهند به طور مثال اختلال خواب، ریزش آب بینی، فراخ شدگی مردمک چشم، راست شدن موهای رسانیده)عوارض امتناع(از انویه می باشند. اما، نوری‌فاز ه (همیشه) کشیدن هاء، بدن‌خطر، شما با دکتوراندام و دلیدی. اینها نشانه های دوری جویی جویی از این دوا وعادت کردن شما به آن با هم یکی نیستند.

گستورات مصرف انویه به این توافق برسد که شما چگونه تداوی را به درازمت تر با اوپیودها، بدن با این دوا عادت می کند یعنی خوش‌الفرا را به اندازه ی بیشتر آن مصرف کنید پایان برسانید در هنگام تداوی و روانی شما به دوا ی رشد مقاومت در مقابل آن؛ و اگر هم شما بخواهید که به تأثیر قلبی آن برسد؛ این مسئله منتج به رشد وابستگی جسمانی شما می‌گردد.

برای به حد اقل رسانیدن خطرهای فوق، این در نهایت مهم است که شما دوا ی خود رامطابق با تجویز آن مصرف کنید ، نه کم و نه بیش و نه هم برای مدت بیشتر از آنچه که روی آن توافق به عمل آمده است. اگر درد شما پس از پایان مدت درمان هنوز هم به جا باشد، برای دریافت مشورت با دکتور خود تماس بگیرید.

یک اشیر پستان دهمی

حامله باشید یا شیر پستان بدهید، این مهم است که شما پیش از آغاز نمون(اگرخط درمان، با دکتور خود تماس بگیرید.

شما که در هنگام درد عاجل، با انویه مرکبات افیونی نظیرای

ترباک(درمان می شوید

برای شما این نسخه دوا ی تسکین درد نوشته شده است:

دوا ی شما به اصطلاح مرکب ترباک (opioid)نامیده می‌شود. یکی باشد یا دوا ی شیه مورفین که هر دوی شان دارای یک تأثیر مادم ی ژوئقی) و امکان معاد شدن به آن درست مانند مرکب ترباک، با مورفین برای آرامش درد به کار برده می‌باشند. اما خطر عوارض جانبی کثیرات را که به‌اعتیاد به مورفین می باشد. تمام مرکبات ترباک (اوپیودها) که جزو انویه مخدره شمرده می شوند. اگر شما ماده ی کدئین (kodein) (Citodon) می باشد مصرف کرده باشید، این دوا در بدن به می شوند را نیز مصرف نمایند، فراموش نه کنید‌گونه مثال در ترکیب سیتودن(اگر شما داروهای آرام مورفین تبدیل می شود. هرگاه شما دواهای دیگری و که این موضوع را به اطلاع دکتور برسانید. به ویژه این مهم است که خواب مصرف زمیید مثال ً انواع بنزودیازپین ها (benzodiazepine). نسخه یا داروهای طبیعی را مصرف کنید این مسئله را نیز بخش یا برای اگر گاهی هم شما دواهای بدون به آگاهی دکتور برسانید.

نظ و عوارض جانبی مرکبات ترباک (اوپیودها) تأثیر

بسیار خوب دارند و این مهم است که برای شما داده شده است، دنبال کنید. هدف این است که مقدار در هنگام دکه دوا برای شما تا آنجا که امکان دارد تأثیر شما همان تجویزی را که مصرف دوا ی شما را باید طوری تنظیم نمود و نیز عوارض جانبی آن در کمترین اندازه باشد. یک مسکن غیر کفیی،و دردهای به طور قابل ملاحظه ای صعب‌العلاج را بیشتر خوب داشته‌هایی دارو عامل افزایش عوارض جانبی خطر بروز دردهای درازمدت می‌کند. از سوی دگر، یک مقدار بیش از اندازه یی‌گرد به طور مثال کم حالی | خواب آلودگی، خبضیت، دلیدی، حسنگی و مرکبات ترباک موجب بنتر شدن هم‌آهنگی و موازنه می‌مرکباتکه اختلالات خواب. افزون براین، گردد.

در هنگام تداوی، به شما توصیه می‌گردد که از رانندگی موتر و دگر فعالیت‌هانی که به دقت توجه نیاز دارند، خودداری نمایید. در همین حال، از نوشیدن مشروبات الکولی و دگر دواهای آرامبخش و خواب آور (بنزودیازپین ها) خودداری نمایید زیرا که آنها به معنای افزایش خطر تأثیرات جانبی شدید می باشند.