

Informacije za pacijente

losartan	Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid
eprosartan	Teveten/Comp
valsartan	Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto
irbesartan	Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea
kandesartan	Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesarstan, Candesarstan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,
telmisartan	Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi
Lijekove za liječenje dijabetesa	
metformin	Metformin, Comptact, Eucras, Glucophage, Janumet, Jentaduet, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo
empagliflozin	Jardiance, Synjardy, Glyxambi
kanagliflozin	Invokana, Vokanamet
dapagliflozin	Forxiga, Xigduo, Qtern
ertugliflozin	Steglatro, Segluromet, Steglujan
Druge lijekove	

Lijekovi protiv bolova u obliku gela ili spreja se slobodno mogu koristiti. Tablete i tečni lijekovi sa paracetamolom (Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin) se takođe mogu koristiti.

Nikada ne prelazite preporučene doze!

Napravila Terapijska grupa za Starije i lijekove avgust 2018. g., verzija 2

Vama koji uzimate

LIJEKOVE

koji nose veliki rizik od ozbiljnih nuspojava pri akutnim stanjima kod dehidracije

- *proljevanje*
- *povraćanje*
- *visoka temperatura (preko 38 °C)*
- *val vrućine*
- *akutna bolest sa teškoćama da se jede ili pije*

Neki od lijekova koji se koriste za liječenje srčanih oboljenja, visokog pritiska, bolova i dijabetesa mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava ukoliko se koriste kada je balans tekućine u tijelu poremećen.

Zapamtite:

Postoji rizik za ozbiljne nuspojave ovih lijekova u slučaju dehidracije kao što su povraćanje, proljev, povišena temperatura, visoka toplota ili stanja koja čine da ne možete jesti ili piti.

Rizik za ozbiljne nuspojave se povećava s godinama ili kod smanjene funkcije bubrega.

Kako reagirati u slučaju dehidracije?

Ako uzimate neke od gore navedenih lijekova, trebate napraviti pauzu u Vašem liječenju u situacijama u kojima može doći do dehidracije. Ako tegobe prestanu, liječenje se ponovo može nastaviti direktno nakon prestanka tegoba.

Obratite se zdravstvenim ustanovama ukoliko ste nesigurni!

.....

Ako uzimate sljedeće lijekove:

Lijekove protiv bolova (analgetike)		
	diklofenak	Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, EezeNeo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte
	piroxikam	Brexidol
	tenoxicam	Alganex
	meloxicam	Meloxicam
	ibuprofen	Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin
	naproxen	Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo
	ketoprofen	Orudis/Retard
	dexibuprofen	Tradil
	dexketoprofen	Enantyum, Ketesse
	celecoxib	Celebra, Celecoxib
	etoricoxib	Arcoxia, Turox
	nabumeton	Relifex
Lijekove za izlučivanje tekućine (diuretike)		
	bendroflumetiazid	Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite
	hidroklortiazid	Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hidroklortiazid
	klortalidon	Hygropax
	metolazon	Metolazon
	furosemid	Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard
	bumetanid	Burinex
	torasemid	Torasemid, Torem
	spironolakton	Spironolactone, Spironolakton
	eplerenon	Eplerenon, Inspira
	amilorid	Amilorid
Lijekove za liječenje srčanih bolesti i povišenog pritiska		
	digoxin	Digoxin, Lanoxin
	kaptopril	Captopril
	enalapril	Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp
	lisinopril	Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid
	perindopril	Coversyl Novum
	ramipril	Ramipril, Triatec, Ramipril/Hidroklortiazid
	fosinopril	Fosinopril
	kinapril	Accupro Comp