

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2026-05-21

Innehållsansvar: Birgit Edin, (bired10), Processchef

Giltig till: 2028-05-21

Granskad av: Zakaria Einbeigi, (zakei), Överläkare

Godkänd av: Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

Regional rutin

Administration av hormonell antitumöral behandling i primärvården

Bakgrund

Hormonell behandling vid tumörsjukdom kan i vissa fall ges som intramuskulär eller subkutan injektion, exempelvis vid bröstcancer och prostatacancer med läkemedel som exempelvis fulvestrant, goserelin, pamorelin, och leuprorelinacetat.

Rutinen gäller administration subkutant eller intramuskulärt (KVÅ-kod DTO21 och DTO11) i primärvården där förskrivning sker via specialistvården på sjukhus.

Arbetsbeskrivning

- Recept skrivs inom specialistvården på sjukhus.
- Remiss (förtryckt eller sedvanlig) skickas till respektive vårdcentral med information om intervall och eventuell provtagning.
- Uppföljning av behandling sker via specialistvården på sjukhus.

Innehållsansvarig

Samordningsråd onkologi.

Bilaga 1.

Distriktssjuksköterskeremiss antihormonell behandling

Onkologen skriver recept, inga prover behövs inför injektion.

Tacksam hjälp med administrering av följande läkemedel:

- Leuprorelin:** Läkemedlet är en antihormonell behandling som ges som engångsdos på 42 mg subkutant var sjätte månad:
En gång Fem gånger Tills vidare

- Triptorelin:** Läkemedlet är en antihormonell behandling som ges som en engångsdos på 22,5 mg intramuskulärt var sjätte månad:
En gång Fem gånger Tills vidare

- Goserelin:** Läkemedlet är en antihormonell behandling som ges som ett implantat på 3,6 mg som injiceras subkutant i främre bukväggen var 28:e dag tills vidare.

- Fulvestrant:** Läkemedlet är en antihormonell injektion som ges intramuskulärt var 28:e dag tills vidare. Efter första dosen ska patienten få en uppladdningsdos efter 14 dagar och därefter en dos till efter ytterligare 14 dagar (dvs dag 1, 14 och 28). Därefter ges behandlingen var 28:e dag tills vidare. Fulvestrant ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1–2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

- Annat**.....

Behöver du som distriktssjuksköterska/sjuksköterska rådgivning eller kontakt per telefon?

Välkommen att ringa på telefonnummer:

Med vänlig hälsning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Birgit Edin, (bired10), Processchef

Granskad av: Zakaria Einbeigi, (zakei), Överläkare

Godkänd av: Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

Dokument-ID: SSN11800-2140136717-949

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-21

Giltig till: 2028-05-21