




Pediatri · Barnmedicin

Tuberkuloza aktive

Aktiv tuberkulos



Namn Emri

	Jeni infektuar me bakterie tuberkulozi. Tuberkuloza është sëmundje shumë e rëndomtë në botë. Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.
	Ti ke atë që quhet tuberkuloza aktive. Du har det som heter aktiv tuberkulos.
	Je i detyruar të marrësh trajtim për 6 muaj që të shërohesh dhe të mos e infektosh dikë tjetër. Du måste ha behandling i 6 månader för att bli frisk och inte smitta någon annan.
	Mund të jetosh si zakonishtë dhe të ushtrosh, shkosh në shkollë dhe të takosh shokë gjatë trajtimit nëse ta lejon mjeku. Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen när din läkare tillåter det.

Pediatri • Barnmedicin

Trajtim

Behandling

	Gjatë dy muajve të parë do të marrësh 4 lloje të medikamenteve që quhen Rimactan, Tibinide, Myambutol dhe Pyrazinamid. De första två månaderna kommer du att få 4 olika mediciner som heter Rimactan, Tibinide, Myambutol och Pyrazinamid.
	Gjatë 4 muajve në vijim do të vazhdosh me dy lloje medikamentesh: Rimactan dhe Tibinide. De följande 4 månaderna kommer du att fortsätta med två mediciner: Rimactan och Tibinide.
	Duhet të marrësh medikamente cdo mëngjes. Pritni së paku një orë para se të hani mëngjes. Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.
	Është shumë me rëndësi që të mos i harroni medikamentet. Nëse i harroni medikamentet bakteriet mund të bëhen më pak të ndieshme ndaj medikamenteve. Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.
	Medikamentet mund ti marrësh mes orës 6 dhe 10. Pa marrë parasysh se kur i merr duhet të pritni së paku 1 orë për të ngrënë mëngjes. Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dom måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.

Pediatri · Barnmedicin

Informata mbi efektet anësore

Information om biverkningar

	Medikamentet e bëjnë urinën me ngjyrë të kuqe/portokalli. Nuk është rrezik. Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.
	Mund të ndiesh lodhje, dhimbje në stomak dhe mundim. Këto telashe zakonisht kalojnë. Gjithashtu mund të fitosh kuarje në lëkurë dhe puqrra. Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.
	Nëse ke shumë telashe duhet ta kontaktosh infermierën në qendrën pranuese për vlerësim. Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.
	Është me rëndësi që të hani mëngjes cdo ditë. Ashtu është më pak rrezik që të fitoni dhimbje stomaku dhe të keni mundim nga medikamentet. Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.

Pediatri • Barnmedicin

Kontrollat

Kontroller

	Vizitë te infermierja cdo javë në 2 muajtë e parë, pastaj 1 herë në muaj. Ndarja e medikamenteve në dozuesin tëndë, analizë urine dhe gjaku. Besök hos sjuksköterska varje vecka de första 2 månaderna, sedan 1 gång i månaden. Delning av mediciner i din dosett, urinprov och blodprov.
	Vizitë te mjeku i syve 2-3 herë gjatë dy muajve të parë. Besök hos ögonläkare 2-3 gånger de första två månaderna.
	Vizitë te mjeku pas trajtimit 2 mujor dhe 6 mujor. Besök hos läkare efter 2 månader och 6 månaders behandling.
	Vizitë te mjeku 6 muajë pas përfundimit të trajtimit. Besök hos läkare 6 månader efter avslutad behandling.
	Mjeku yt quhet..... Mund të na telefonosh në nr e tel.....nëse ke pyetje apo ndonjë problem Din läkare heter Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.