

Pedijatrija · Barnmedicin

Tuberkuloza, aktivna

Aktiv tuberkulos

Namn Ime

	<p>Zaraženi ste bakterijom tuberkuloze. Tuberkuloza je veoma česta infekcija u svijetu.</p> <p>Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.</p>
	<p>Imate ono što se naziva aktivna tuberkuloza.</p> <p>Du har det som heter aktiv tuberkulos.</p>
	<p>Morate se liječiti 6 mjeseci da biste ozdravili i da ne biste zarazili nekog drugog.</p> <p>Du måste ha behandling i 6 månader för att bli frisk och inte smitta någon annan.</p>
	<p>Možete živjeti kao obično i trenirati, ći u školu i sretati prijatelje tokom liječenja kada vam vaš doktor to odobri.</p> <p>Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen när din läkare tillåter det.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Liječenje





Behandling

	<p>Tokom prva dva mjeseca dobijaćete 4 različita lijeka koji se zovu Rimactan, Tibinide, Myambutol i Pyrazinamid.</p> <p>De första två månaderna kommer du att få 4 olika mediciner som heter Rimactan, Tibinide, Myambutol och Pyrazinamid.</p>
	<p>Sljedeća 4 mjeseca nastavićete da dobijate dva lijeka: Rimactan i Tibinide.</p> <p>De följande 4 månaderna kommer du att fortsätta med två mediciner: Rimactan och Tibinide.</p>
	<p>Uzimaćete lijekove svakog jutra. Sačekajte s doručkom bar sat vremena.</p> <p>Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.</p>
	<p>Veoma je važno da ne zaboravite uzeti lijekove. Ako to zaboravite, bakterije mogu postati manje osjetljive na lijekove.</p> <p>Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.</p>
	<p>Možete popiti lijekove bilo kad između 6 i 10 sati. Bez obzira kada ih uzmete, morate uvijek sačekati bar 1 sat da doručkujete.</p> <p>Du kan ta tableterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dem måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Informacije o nuspojavama






Information om biverkningar

	<p>Lijekovi boje mokraću u crveno-narandžastu boju. To nije opasno.</p> <p>Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.</p>
	<p>Možete postati umorniji, može vas zaboliti stomak ili možete dobiti mučninu. Ove nuspojave obično prođu. Možete dobiti i svrab kože i ekcem.</p> <p>Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.</p>
	<p>Ako imate jake nuspojave, obratite se medicinskoj sestri u vašoj ordinaciji za procjenu.</p> <p>Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.</p>
	<p>Važno je da doručkujete svakog jutra. Tako će se smanjiti rizik od toga da vas zaboli stomak i da vam bude muka od lijekova.</p> <p>Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Kontrole

Kontroller

	<p>Posjeta kod medicinske sestre svake sedmice tokom prva dva mjeseca, zatim jednom mjesečno. Podijela lijekova u vašu dozu, davanje uzorka mokraće i vađenje uzorka krvi.</p> <p>Besök hos sjuksköterska varje vecka de första 2 månaderna, sedan 1 gång i månaden. Delning av mediciner i din dosett, urinprov och blodprov.</p>
	<p>Posjeta očnom ljekaru 2-3 puta tokom prva dva mjeseca.</p> <p>Besök hos ögonläkare 2-3 gånger de första två månaderna.</p>
	<p>Posjete ljekaru nakon 2 mjeseca i nakon 6 mjeseci liječenja.</p> <p>Besök hos läkare efter 2 månader och 6 månaders behandling</p>
	<p>Posjeta ljekaru 6 mjeseci nakon završenog liječenja.</p> <p>Besök hos läkare 6 månader efter avslutad behandling.</p>
	<p>Vaš ljekar se zove</p> <p>Možete nam telefonirati na broj telefona..... ako imate pitanja ili problema.</p> <p>Din läkare heter</p> <p>Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.</p>