




Pedijatrija · Barnmedicin

Latentna tuberkuloza

Latent tuberkulos

Namn Ime

	<p>Zaraženi ste bakterijom tuberkuloze. Tuberkuloza je veoma česta infekcija u svijetu.</p> <p>Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.</p>
	<p>Imate ono što se zove latentna tuberkuloza. To znači da imate bakterije u tijelu, ali da one nisu aktivne. Niste bolesni i ne možete da zarazite nekog drugog.</p> <p>Du har det som heter latent tuberkulos. Det innebär att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.</p>
	<p>Postoji rizik da bolest kasnije izbije kasnije, i tada može biti ozbiljna. Zato vam preporučujemo da uradite liječenje protiv latentne tuberkuloze tokom tri mjeseca.</p> <p>Det finns risk att sjukdomen bryter ut senare, och den kan då bli allvarlig. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under tre månader.</p>
	<p>Možete živjeti kao obično i trenirati, ići u školu i sretati prijatelje tokom liječenja.</p> <p>Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Liječenje





Behandling

	<p>Uzimćete sljedeće lijekove: Du ska ta följande mediciner:</p> <p>Tibinidemg tablett en gång varje dag/ tableta jedan put dnevno</p>
	<p>Rimactan mg kapsel en gång varje dag/ kapsula jednom dnevno</p>
	<p>Uzimaćete lijekove svakog jutra. Sačekajte s doručkom bar sat vremena.</p> <p>Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.</p>
	<p>Veoma je važno da ne zaboravite uzeti lijekove. Ako to zaboravite, bakterije mogu postati manje osjetljive na lijekove.</p> <p>Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.</p>
	<p>Možete popiti lijekove bilo kad između 6 i 10 sati. Bez obzira kada ih uzmete, morate uvijek sačekati bar 1 sat da doručkujete.</p> <p>Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dom måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Informacije o nuspojavama






Information om biverkningar

	<p>Lijekovi boje mokraću u crveno-narandžastu boju. To nije opasno.</p> <p>Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.</p>
	<p>Možete postati umorniji, može vas zaboliti stomak ili možete dobiti mučninu. Ove nuspojave obično prođu. Možete dobiti i svrab kože i ekcem.</p> <p>Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.</p>
	<p>Ako imate jake nuspojave, obratite se medicinskoj sestri u vašoj ordinaciji za procjenu.</p> <p>Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.</p>
	<p>Važno je da doručujete svakog jutra. Tako će se smanjiti rizik od toga da vas zaboli stomak i da vam bude muka od lijekova.</p> <p>Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.</p>

Pedijatrija · Barnmedicin

Kontrole

Kontroller

	<p>Posjeta medicinskoj sestri nakon 2 sedmica; davanje uzorka urina i vađenje uzorka krvi.</p> <p>Besök hos sjuksköterska efter 2 veckor; urinprov och blodprov</p>
	<p>Posjeta medicinskoj sestri nakon 6 sedmica; davanje uzorka urina i vađenje uzorka krvi.</p> <p>Besök hos sjuksköterska efter 6 veckor; urinprov och blodprov</p>
	<p>Završna posjeta doktoru nakon 3 mjeseca liječenja.</p> <p>Vaš doktor se zove</p> <p>Avslutande besök hos läkare efter 3 månaders behandling.</p> <p>Din läkare heter</p>
	<p>Možete nam telefonirati na broj telefona..... ako imate pitanja ili problema.</p> <p>Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.</p>
	<p>Ako odjednom počnete mnogo da kašljete, dobijete visoku temperaturu, nedostatak apetita i smanjenje težine, javite nam se.</p> <p>Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.</p>