



Barnmedicin • د ماشومانو داخله کلینیک

غیر فعال توبرکلوز

Latent tuberkulos


نوم Namn

	تاسی د غیر فعال توبرکلوز د بکټریا په وسیله مبتلا شوی یاست. توبرکلوز په نړۍ کې یو ډیر عادی ساری ناروغي ده. Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.
	دغه ډول توبرکلوز چې تاسی لری د غیر فعال توبرکلوز په نامه یادېږی. دا پدی معنی داه چې د دی ناروغي بکټریاوی ستاسی په بدن کې د استراحت په حالت کې دی. تاسی ناروغ نه یاست او ستاسی ناروغي کوم بل نفر ته سرایت نه کوی. Du har det som heter latent tuberkulos. Det innebär att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.
	خو د دی خطر شته چې دغه ناروغي وروسته ظهور وکی او تاسی په ډیر شدید ډول ناروغه شی. پدی خاطر دی چې موږ تاسی ته سپارښت کوو چې تاسی باید د غیر فعال توبرکلوز په خاطر د درو میابښتو په موده تداوی شی. Det finns risk att sjukdomen bryter ut senare, och den kan då bli allvarlig. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under tre månader.
	د معالجي په موده کې تاسی کولای شی چې په عادی ډول ژوند وکی، خپل ورزش وکی، خپل ښونځی ته ولاړ شی او خپل ملگری ووینی. Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen.

Barnmedicin • د ماشومانو داخله کلینیک

معالجه

Behandling

	تاسی دا دواګانی مصرف کړی: Du ska ta följande mediciner: Tibinidemg tablett en gång varje dag/ تابلېټ یو ځل او هره ورځ
	Rimactan mg kapsel en gång varje dag/ دانی کپسول یو ځل هره
	تاسی باید هر سهار خپل دواوی وڅوری. د دوا د اخیستلو نه وروسته باید چی تاسی حد اقل یو ساعت صبر وکی او له هغه نه وروسته د سهار چای او خواړه وڅوری. Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.
	دا ډیره مهمه ده چی تاسی خپل دوا خوړل د یاده و نه باسی. که داسی وی چی تاسی خپل دوا هیږه کړی، کیدای شی چی بکتریاوی د دوا په مقابل کی لږ حساسیت ښکاره کړی. Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.
	تاسی کولای شی چی خپل تابلېټونه کوم وخت د سهار د ۶ او ۱۰ بجو په منځ کی وڅوری اما تاسی باید همیشه کم تر کمه پوری ۱ ساعت صبر وکی او له هغه نه وروسته د سهار چای او ډوډی وڅوری. Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dom måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.

Barnmedicin • د ماشومانو داخله کلینیک

د جانبی عوارضو په باره کی معلومات

Information om biverkningar

	دواوی ستاسی د ادرار رنگ سور / نارنجی کوی چی دا خطرناک نه دی. Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.
	کیدای شی تاسی د ستړیا احساس وکی، په خپته کی مو درد پیدا شی او د خوا گرځیدل حالت ولری چی اکثره وختونه دا تکلیفونه پخپله ورکیری. Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.
	که چیرته دا تکلیفونه مو ډیر شی نو د تشخیص دپاره باید تاسی د کلینیک د نرس سره تماس ونیسی. Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.
	دا مهمه ده چی تا هر سهار خپل ناشتا و خوری پدی خاطر چی د دوا د خوړلو په خاطر د نس درد او د خوا گرځیدل خطرونه لږ سی. Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.

Barnmedicin • د ماشومانو داخله کلینیک

معاینات

Kontroller

	د نرس سره ملاقات پسله ۲ هفتو څخه ؛ د ادرار او ویني معاینات اخیستل Besök hos sjuksköterska efter 2 veckor; urinprov och blodprov
	د نرس سره ملاقات پسله ۶ هفتو څخه ؛ د ادرار او ویني معاینات اخیستل Besök hos sjuksköterska efter 6 veckor; urinprov och blodprov
	آخرنی کتنه د ډاکټر سره ۳ میاشتې پسله معالجي څخه . ستاسی د ډاکټر نوم دی . Avslutande besök hos läkare efter 3 månaders behandling. Din läkare heter
	که تاسی کوم پوښتنه ولری، تاسی کولای شی زموږ سره په لاندی شماره اړیکي ونیسی. Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.
	که تاسی ته نا ځایه ډیر توخی پیدا شی، تبه وکی، بی اشتهايي تاسی ته پیدا شی و یا وزن مو کم شی نو باید چی تاسی زموږ سره اړیکي ونیسی. Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktneđgång ska du höra av dig till oss.