

Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård

Tuberkulozi latent me trajtim

Latent tuberkulos med behandling



Tuberkulozi (TBC) është një sëmundje e cila shkaktohet nga një bakterie.

Tuberkulos (TBC) är en sjukdom som orsakas av en bakterie.



Njeriu mund të infektohet nëse një person që ka tuberkuloz në traktin respirator kollitet për një kohë të gjatë.

Man kan smittas om en person som har tuberkulos i luftvägarna hostar på en under en lång tid.




Njeriu mund të marrë një tuberkuloz latent (të fshehur) ose tuberkuloz aktiv. Ti ke diçka që quhet **tuberkuloza latente**.

Man kan få antingen latent (vilande) tuberkulos eller aktiv tuberkulos. Du har det som heter **latent tuberkulos**.



Kjo d.m.th. se i ke bakteriet në trup por janë joaktive. Ti nuk je i sëmurë dhe nuk mund ta infektosh dikë tjetër.

Det betyder att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.




Nëse trupi yt dobësohet, ti mund të sëmuresh nga **tuberkulozi aktiv**. Prandaj të rekomandojmë ta marrësh trajtimin kundër tuberkulozës gjatë _____ muajshë.

Om din kropp försvagas kan du insjukna i **aktiv tuberkulos**. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under _____ månader.

Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård


Tuberkulozi latent me trajtim

Latent tuberkulos med behandling




Ti mund të jetosh e të ushtrosh si zakonisht, të shkosh në shkollë ose të punosh dhe të takohesh me miq gjatë trajtimit.

Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan eller arbeta och träffa vänner under behandlingen.




Do ti marrësh këto medikamente:

Du ska ta följande mediciner:
Tibinide tablett mg tablett en gång varje dag/
tablettë një herë në ditë



Rimactan kapsel mg tablett en gång varje dag/
kapsulë një herë në ditë



Pyridoxin tablett mg tablett en gång varje dag/
tablettë një herë në ditë








Duhet të marrësh medikamente cdo mëngjes. Prit së paku një orë para se të hash mëngjes.

Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst 1 timme med frukost.

Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård

Tuberkulozi latent me trajtim

Latent tuberkulos med behandling

	<p>Është me rëndësi të hani mëngjes cdo ditë. Atëherë rreziku do të jetë më i vogël për dhimbje në stomak dhe mundim nga medikamentet.</p> <p>Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.</p>
	<p>Është shumë me rëndësi të të kujtohen medikamentet. Nëse i harron mund të ndodhi që bakteriet të bëhen më pak të ndieshme ndaj medikamenteve.</p> <p>Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.</p>
	<p>Nuk është rrezik. Rimactan ngjyra urina dhe lotët e kuq.</p> <p>Rimactan färgar urin och tårar röda. Det är ofarligt.</p>
	<p>Mund të ndiesh lodhje, dhimbje stomaku dhe të kesh mundim. Këto telashe zakonisht kalojnë. Gjithashtu mund të fitohet kruarja e lëkurës dhe puqrra.</p> <p>Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.</p>
	<p>Nëse ke shumë telashe duhet të kontaktosh me infermierën në qendrën pranuese për një vlerësim: _____</p> <p>Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning: _____</p>

Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård

Tuberkulozi latent me trajtim

Latent tuberkulos med behandling



Nëse papritmas merr kollitje të fortë, temperaturë, humbje apetiti apo humbje peshe duhet të paraqitesh tek ne.



Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.



Shmangu nga alkoholi dhe preparatet e ushqimit shëndetësor. Kij kujdes me tabletat kundër dhembjes.

Undvik alkohol och hälsokostpreparat. Var försiktig med värktabletter.



Trego se ti merr Tibinide/Rimactan nëse ti merr ilaçe të tjera të përshkruara nga mjeku.

Berätta att du tar Tibinide/Rimactan om du får annan medicin utskrivna av läkare.