

# Infektionssjukvård

## Latent tuberkulos med behandling




Tuberkulos (TBC) är en sjukdom som orsakas av en bakterie.




Man kan smittas om en person som har tuberkulos i luftvägarna hostar på en under en lång tid.



Man kan få antingen latent (vilande) tuberkulos eller aktiv tuberkulos. Du har det som heter **latent tuberkulos**.




Det betyder att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.




Om din kropp försvagas kan du insjukna i **aktiv tuberkulos**. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under \_\_\_\_ **månader**.

# Infektionssjukvård

## Latent tuberkulos med behandling




Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan eller arbeta och träffa vänner under behandlingen.




Du ska ta följande mediciner:  
Tibinide tablett ..... mg ..... tablett en gång varje dag



Rimactan kapsel ..... mg ..... tablett en gång varje dag




Pyridoxin tablett ..... mg ..... tablett en gång varje dag



Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst 1 timme med frukost.

# Infektionssjukvård

## Latent tuberkulos med behandling



Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.



Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.



Rimactan färgar urin och tårar röda. Det är ofarligt.






Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.



Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning: \_\_\_\_\_

# Infektionssjukvård

## Latent tuberkulos med behandling

	<p>Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.</p>
	<p>Undvik alkohol och hälsokostpreparat. Var försiktig med värktabletter.</p>
	<p>Berätta att du tar Tibinide/Rimactan om du får annan medicin utskrivna av läkare.</p>