



# Kunskapscentrum för sexuell hälsa


## Kroppen under en graviditet



En graviditet startar när en spermie tränger in i ett ägg. Det kallas befruktning.



Äggen finns i äggstockarna. Ett ägg lossar (ägglossning) ungefär en gång i månaden mittemellan menstruationerna.



Spermier tillverkas i pungen och kommer ut genom penis vid utlösning.




Om två personer har samlag med penis i slida kan spermier komma in i slidan och simma upp mot ägget i äggledaren.



Det går också att föra in spermier i slidan med en spruta utan nål. Det kallas insemination.

# Kunskapscentrum för sexuell hälsa

## Kroppen under en graviditet




Graviditeten startar när spermien tränger in i ägget.



Det befruktade ägget rör sig sedan mot livmodern.



Det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderns slemhinna, där växer det och utvecklas under ungefär 9 månader.



Under graviditeten kommer ingen mens.



Efter ungefär 9 månader är det förlossning, då barnet föds.

# Kunskapscentrum för sexuell hälsa


## Att få barn




En del personer adopterar barn.



En del blir gravida genom att ha samlag med penis i slida.



En del personer kan få hjälp av sjukvården för att bli gravida, två kvinnor som vill ha barn med varandra och andra som har svårt att bli gravida.



För att bli gravid behöver en person ha en livmoder.