

Aborti i hershëm mjekësor

Tidig medicinsk abort




Ti do ta gëlltitësh një tabletë të parë në pranim. Nëse ti vjell brenda 30 minutave, ti duhet të kthehesh dhe ta marrësh një tabletë të re.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



Ti mund të kesh dhembje të vazhdueshme të vogla dhe të fillojë gjakderdhja. Nëse ti ke shumë gjakderdhje ose ke shumë dhembje, shko në një emergjencë gjinekologjike.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



Trajtimi vazhdon në spital 24-72 orë pasi që ti e ke gëlltitur tabletën e parë.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



Së pari, ha mëngjes në shtëpi. Ti i ke marrë me vete në shtëpi tabletat kundër dhimbjes. Gëlltit tabletat kundër dhimbjes 30 minuta para se të shkosh në spital.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



Kur të vijsh në spital, ti duhet t' i futësh deri në 4 tableta thell në vaginë. Nëse ti nuk ke filluar me gjakderdhje pas 3 orësh, ti duhet t' i futësh deri në 2 tableta.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


Aborti i hershëm mjekësor

Tidig medicinsk abort




Shtrihu dhe mos shko në tualet brenda 30 minutave pas marrjes së tabletave.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tableterna.



Nëse ti ke dhimbje, mund ta lehtësosh dhimbjen duke përdorur një jastëk ngrohës, TENS ose duke lëvizur.

Om du har ont kan du lindra smärtan genom att använda värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



Ne mund të të japim tableta për zbutjen e dhembjeve dhe injeksione me morfinë.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



Ne gjithashtu mund të të japim anestezi lokale në anën e shtupës së mitrës. Në raste të tilla, ti duhet të ulesh në një karrige kontrollimi gjinekologjik në mënyrë që ne të mund t' i afrohemi mitrës.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



Efektet anësore të zakonshme janë që ti merr ethe, ligështi, vjellje ose diarre pas trajtimit.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


Aborti i hershëm mjekësor

Tidig medicinsk abort




Ti qëndron për rreth 4-6 orë në spital, pastaj ti mund të shkosh në shtëpi. Ti nuk duhet ta ngasësh makinën për të shkuar në shtëpi sepse ti merr ilaçe që mund të ndikojnë në aftësinë tënde për të reaguuar.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



Ti do të kesh rrjedhje gjaku për të paktën 3 ditë, por gjithashtu gjaku mund të rrjedh për disa javë. Mos përdor tampon / kupa menstruale, larje ose të bëjshë marrëdhënie seksuale për sa kohë që të rrjedh gjaku.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




Nëse ty të rrjedh shumë gjak ose ke aq shumë dhembje sa që nuk të ndihmojnë as tabletat për qetësimin e dhembjeje ose nëse ti ke sekrecione të bardha vaginale me erë të keqe apo gjakderdhje, ti shko në një emergjencë gjinekologjike.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



Kur të kenë kaluar 3 javë nga aborti i yt, ti duhet të bëjshë një test shtatzënie. Nëse testi është pozitiv, ti duhet të na kontaktosh.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



Ti mund të flasësh për abortin tënd me një kurator nëse ti dëshiron.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.