

الإجهاض الطبي المبكر

Tidig medicinsk abort




عليك بلع القرص الأول في العيادة. عليك بلع القرص الأول في العيادة. إذا تقيأت خلال 30 دقيقة فيجب أن تعود مرة ثانية لتعاطي قرصا جديدا.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



يمكن أن تصابي بوجع مستمر ويبدأ نزيف لديك. إذا كنت تنزفين بكميات كبيرة أو إذا كنت تعانين من وجع شديد للغاية عليك الذهاب إلى عيادة الطوارئ لأمراض النساء.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



تستمر المعالجة في المستشفى 24 - 72 ساعة بعد بلع القرص الأول.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tabletten.



عليك القيام أولا بتعاطي وجبة الإفطار في المنزل. لقد أعطيناك أقراص مسكنة للألم لتأخذها إلى المنزل. ابلي القرص المسكن للألم قبل 30 دقيقة من موعد تواجدك في المستشفى.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



عند حضورك إلى المستشفى سيتم اعطاءك 4 أقراص تضعها في موضع في أقصى مكان داخل المهبل. إذا لم يبدأ النزف بعد 3 ساعات فستحتاجين إلى ادخال قرصين جديدين.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


الإجهاض الطبي المبكر

Tidig medicinsk abort




استلقي على ظهرك وا تذهبي إلى المراض خلال 30 دقيقة بعد تعاطي الحبوب.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.



إذا كنت تشعرين بأوجاع فيمكن أن يتم تخفيف الأوجاع عن طريق وسادة مدفئة، أو باستخدام جهاز التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد TENS أو الحركة.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



يمكن أن نعطيك أقراص مخففة للآلام وحقن تحتوي على المورفين.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



كما يمكن أن نعطيك تخدير موضعي على جانب عنق الرحم. في هذه الحالة عليك الجلوس في كرسي الفحص المهبلي لكي نتمكن من الوصول إلى عنق الرحم.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



من بين العوارض الجانبية المعتادة هناك إمكانية إصابتك بحمى أو قشعريرة أو غثيان أو تقيؤ أو اسهال بعد المعالجة.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


الإجهاض الطبي المبكر

Tidig medicinsk abort




تبقين ما بين 4 - 6 ساعات في المستشفى ومن ثم بإمكانك العودة إلى المنزل. لا يسمح لك سيطرة السيارة عند العودة إلى المنزل لأنك تعاطيت أدوية تؤثر على قدرة رد الفعل لديك.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



يحصل النزيف عندك خلال 3 أيام ولكن يمكن أن يستمر النزيف عدة أسابيع. لا تستعملي الأصابع القطنية (تامبونج) / كوب الحيض، وتجنبي الاستحمام والجماع المهبلي طالما كنت تنزفين.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




إذا كان النزيف غزيراً أو موجه بشكل لا يساعدك في التغلب عليه تعاطي أدوية لتسكين الآلام أو إذا خرجت إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو نزيف عليك الذهاب إلى عيادة الطوارئ لأمراض النساء.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



بعد مرور 3 أسابيع بعد عملية الإجهاض عليك أن تقومي بعمل فحص الحمل. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية تواصل معنا.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



بإمكانك التحدث عن عملية الإجهاض مع مرشد اجتماعي إذا كنت تريد ذلك.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.