

Rani medicinski abortus

Tidig medicinsk abort




Uzet ćete prvu tabletu na prijemnom odjelu. Ako povratite u roku od 30 minuta možete se vratiti i dobiti novu tabletu.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



Možete dobiti tupi bol i početi krvariti. Ako vrlo krvarite ili imate velike bolove, morate otići na ginekološku hitnu pomoć.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



Tretman se nastavljaju u bolnici 24-72 sata nakon što ste progutali prvu tabletu.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tabletten.



Pojedite prvo doručak kod kuće. Dobili ste tablete protiv bolova sa sobom. Progutajte tablete protiv bolova 30 minuta prije nego što treba da budete u bolnici.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



Kada stignete u bolnicu dobit ćete 4 tablete da stavite duboko u vaginu. Ako ne počnete da krvarite nakon 3 sata potrebno je da stavite još 2 tablete.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du **inte** har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


Rani medicinski abortus

Tidig medicinsk abort




Nemojte lijevati i NE idite na toalet tokom 30 minuta nakon što ste uzeli tablete.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.



Ako vas boli, možete smanjiti bolove korištenjem toplog jastuka, TENS-a ili kretanjem.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



Možemo Vam dati tablete protiv bolova i injekcije sa morfijem.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



Možemo Vam dati i lokalnu anesteziju sa strane grlića materice. U tom slučaju morate sjediti u stolici za ginekološki pregled kako bismo mogli doseći grlić materice.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



Česte nuspojave su da dobijete povišenu temperaturu ili drhtavicu, mučninu, povraćanje ili proliv nakon tretmana.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


Rani medicinski abortus

Tidig medicinsk abort




U bolnici ćete ostati 4-6 sati, a zatim možete ići kući. Ne smijete voziti kući jer lijekovi mogu da utiču na Vašu sposobnost reagiranja.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



Krvarit ćete najmanje 3 dana, ali možete krvariti i više sedmica. Ne koristite tampon / čašicu za menstruaciju, ne kupajte se i nemojte imati spolne odnose dokle god krvarite.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




Ako veoma mnogo krvarite ili imate takve bolove da tablete protiv bolova ne pomažu ili ako Vaš iscjedak ili krvarenje smrde, otiđite u ginekološku hitnu pomoć.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



Kada prođu 3 sedmice nakon abortusa, uradite test na trudnoću. Ako je test pozitivan, kontaktirajte nas.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



Možete razgovarati sa socijalnim radnikom o Vašem abortusu ako želite.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.