

## سقط جنین زود هنگام توسط ادویه

### Tidig medicinsk abort




شما باید یک دانه تابلت را در کلینیک قورت بدهید. اگر شما در طول 30 دقیقه استفراغ کنید، حتماً باید دوباره بیايید و سر از نو یک دانه تابلت بخورید.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



ممکن است به شما درد اندک و دوامدار دست بدهد و خونریزی شما آغاز شود. اگر شما خونریزی بسیار فراوان داشته باشید و یا هم درد خیلی زیاد به شما دست بدهد، باید به یک کلینیک عاجل نسایی بروید.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.




پس از اینکه شما تابلت اول را خوردید، مداوای شما برای 24 تا 72 ساعت در شفاخانه ادامه پیدا می کند.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



نخست، صبحانه را در خانه صرف کنید. برای شما تابلت های درد داده شده است که با خود به خانه ببرید. تابلت های ضد درد را 30 دقیقه پیش از آمدن خود به شفاخانه، قورت بدهید.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



هنگامی که شما به شفاخانه می آیید، 4 تا دانه تابلت را وارد قسمت بالایی مهبل خود بکنید. اگر خونریزی شما پس از 3 ساعت آغاز نه شود، شما باید 2 دانه تابلت دیگر را داخل قسمت بالایی مهبل خود فرو کنید.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


## سقط جنین زود هنگام توسط ادویه

### Tidig medicinsk abort




شما دراز بکشید و پس از اینکه تابلیت ها را خوردید، تا 30 نه باید تشناب بروید.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tableterna.



اگر شما درد داشته باشید می توانید که برای آرامش آن از مشکوله یا تینس استفاده کنید یا هم اینکه حرکت کنید.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



ما می توانیم برای شما تابلیت های ضد درد بدهیم و امپول های دارای مورفین تزریق کنیم.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



ما همچنان می توانیم برای شما ادویه بی حسی موضعی در پهلوئ بزل رجم (بخشی از عنق رجم) بدهیم. در این صورت، لازم است شما بر چوکی معاینات نسایی بنشینید تا ما بتوانیم به بزل رجم شما برسیم.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



عوارض جانبی عادی پس از درمان این است که شما تب کنید، تب لرز کنید، دلبدی (تهوع) داشته باشید، استفراق کنید یا اسهال شوید.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


## سقط جنین زود هنگام توسط ادویه

### Tidig medicinsk abort




شما در حدو ۴ تا 6 ساعت در شفاخانه می باشید و سپس می توانید به خانه بروید. شما اجازه نه دارید رانندگی کنید زیرا ادویه ای که به شما داده می شود بر توانایی عکس العمل شما در هنگام رانندگی تأثیر می گذارد.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



شما باید دست کم برای 3 روز خونریزی کنید، اما امکان دارد که حتی برای چندین هفته هم خونریزی داشته باشید. تا هنگامی که شما خونریزی دارید از استفاده نمودن تامپون / پیاله گگ عادت ماهوار (مینسترل کپ) و از حمام کردن در تشت یا از حوض آبیاری خودداری کنید.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




اگر شما خونریزی بسیار فراوان داشته باشید یا اینقدر درد داشته باشید که تابلیت های درد کمک نه کند یا افزایش بدبو و یا هم خونریزی داشته باشید، باید به یک کلینیک عاجل نسایی مراجعه کنید.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



هنگامی که 3 هفته از سقط جنین شما سپری شود، باید آزمایش حاملگی بدهید. اگر آزمایش حاملگی شما مثبت باشد، باید با ما تماس بگیرید.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



چنانچه شما خواسته باشید، می توانید در باره سقط جنین خویش با یک مددکار اجتماعی صحبت کنید.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.