

د حاملگی په اولو وختو کی د جنین سقط کول د دوا په وسیله

Tidig medicinsk abort




تاسی باید لمرنی ټابلېټ دلته په کلینیک کی وخورئ. که تاسی د ۳۰ دقیقو په موده کاندگی وکړئ، حتمی ده چی تاسی سر د نوی څخه یو دانه ټابلېټ وخورئ.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



کیدای شی چی تاسی ته لږ او دوامداره درد پیدا شی او وینه راتلل مو شروع شی. که ستاسی څخه ډیره زیاته وینه راشی یا ډیر زیات درد درته پیدا شی، تاسی باید یو نسایی عاجل کلینیک ته ورشی.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.




د اول ټابلېټ د خوړلو نه وروسته د ۲۴ - ۷۲ ساعتو لپاره ستاسی درملنه په روغتون کی ادامه پیدا کوی.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



تاسی د سهار ناشتا په کور کی وخورئ. تاسو ته د درد ټابلېټونه ورکړه شوی دی چی په کور کی وخورئ. تاسی دا ټابلېټونه ۳۰ دقیقې مخکی لدی نه چی روغتون ته راشی وخورئ.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



تاسی دا ټابلېټونه ۳۰ دقیقې مخکی لدی نه چی روغتون ته راشی وخورئ. که وینه تلل مو پس له ۳ ساعتو څخه شروع نه شوه، باید چی ۲ دانی نور ټابلېټونه په مهیل کی دننه کړئ.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


د حاملگی په اولو وختو کی د جنین سقط کول د دوا په وسیله

Tidig medicinsk abort




پسله لدی څخه چی تا بلیتونه مو وخورل تاسی پریوخی او د 30 دقیقو دپاره نه باید چی تشناب ته ولاړ شی.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.



که تاسی درد ولری، کولای شی چی د هغه د تسکین په خاطر د مشکولی یا تینس څخه کار واخلي یا دا چی حرکت وکړی.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



موږ کولای شو چی تاسو ته د درد گولی درکو او د مورفین پیچکاری ولگوو.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



موږ کولای شو چی تاسو ته د موضعی بیحسی دوا ستاسو د رجم د عنق په بغل کی ورکړو. پدی صورت، لازمه ده چی تاسی د نسایی پر چوکی بانندی کنبینی ترڅو چی موږ وکولای شو ستاسو د رجم عنق ته لاس رسی پیدا کړو.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



عادی ارځنیز عوارض (منفی تأثیرات) دا دی چی د درملنی نه وروسته، تاسی تبه وکړی، گانگی وکړی او اسهال شی.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.

د حاملگی په اولو وختو کی د جنین سقط کول د دوا په وسیله

Tidig medicinsk abort




تاسی تقریباً د ۴ - ۶ ساعتو پوری په روغتون کی پاته کېږی او چی وروسته له هغه نه کور ته ولاړه شی. تاسی اجازه نه لری چی پدی موده کی موټر وچلوی ځکه چی تاسو ته داسی دوا درکول کېږی چی ستاسی د عکس العمل پر قدرت باندی تاثیر اچوی.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



تاسی باید لږ تر لږه د ۳ ورځو په موده وینه توئیدل ولری، خو کیدای شی چی تاسی حتی تر څو هفتو پوری وینه توئیدل ولری. تر څو چی تاسی وینه توئیدل لری باید د ټامپون / مینسټرل کپ څخه کار وانخلی، په تشت یا حوض کی لمبا ونکړی او جنسی نږدیوالی هم ونکړی.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




که ستاسی وینه توئیدل ډیر زیات وی یا داسی درد ولری چی د درد دواوی کمک ونکړی یا تاسی بدبویه ترشحات یا وینه توئیدل ولری، هغه وخت تاسی باید نسایی عاجل کلینیک ته مراجعه وکړی.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



کله چی ستاسی د سقط جنین څخه ۳ هفتی تیری شی، باید چی د امپندواری ټسټ ورکړی. که د ټسټ نتیجه مو مثبته وی، تاسی باید زموږ سره تماس ونیسی.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



که د ټسټ نتیجه مو مثبته وی، تاسی باید زموږ سره تماس ونیسی.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.