

کورتاژ زودرس دارویی

Tidig medicinsk abort




اولین قرص را بایستی در بخش پذیرش قورت بدهید. اگر در مدت 30 دقیقه استفراغ کنید بایستی برگردید و یک قرص دیگر بگیرید.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



ممکن است دچار درد خفیف دائمی شده و خونریزی کنید. اگر خونریزی بسیار شدید باشد یا دچار درد بسیار شدید بشوید بایستی به بخش اورژانس زنان مراجعه کنید.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.




پس از آنکه شما اولین قرص را قورت بدهید، درمان پس از 24 تا 72 ساعت در بیمارستان ادام می یابد.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tabletten.



اول در خانه صبحانه بخورید. به شما قرص تسکین درد داده شده که با خود به خانه ببرید. قرص های تسکین درد را 30 دقیقه قبل از وقت حضور در بیمارستان قورت بدهید.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



وقتی به بیمارستان می آید بایستی 4 عدد قرص را در بالاترین قسمت درون مهبل (واژن) قرار دهید. اگر پس از گذشت 3 ساعت خونریزی آغاز نشود بایستی 2 قرص دیگر نیز درون مهبل (واژن) قرار دهید.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


کورتاژ زودرس دارویی

Tidig medicinsk abort




دراز بکشید و به مدت 30 دقیقه پس از مصرف قرص ها به توالی نروید.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tableterna.



اگر درد دارید می توانید برای تسکین درد از بالش گرمایشی، دستگاه ماساژ گرمایشی (TENS) استفاده کنید یا قدم بزنید.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



ما می توانیم قرص های تسکین درد بدهیم و مرفین تزریق کنیم.

Vi kan ge smärtstillande tableter och injektioner med morfin.



ما همچنین می توانیم در کنار دهانه رحم نیز بیحسی موضعی بدهیم. در اینصورت بایستی روی یک صندلی معاینه زنانگی بنشینید تا ما بتوانیم به دهانه رحم دسترسی پیدا کنیم.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



عوارض جانبی عادی پس از درمان بصورت تب یا لرن، حالت تهوع، استفراغ و اسهال است.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


کورتاژ زودرس دارویی

Tidig medicinsk abort




شما در حدود 4 تا 6 ساعت در بیمارستان هستید و سپس به خانه می روید. شما اجازه ندارید برای رفتن به خانه رانندگی کنید چون داروهایی به شما داده می شود که روی توان واکنش شما تأثیر منفی می گذارند.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



خونریزی حداقل 3 روز ادامه دارد ولی ممکن است تا چند هفته نیز خونریزی داشته باشید. در مدتی که خونریزی می کنید از استفاده از تامپون/فنجانک پرپوده، غوطه ور شدن در آب یا همخوابگی خودداری کنید.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




اگر خونریزی خیلی زیاد باشد یا استفاده از قرص های تسکین درد کمک نکند یا اگر ترشحات و خونریزی بد بو دارید بایستی به بخش اورژانس زنان مراجعه کنید.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



وقتی 3 هفته از کورتاژ شما بگذرد بایستی یک تست حاملگی انجام دهید. اگر نتیجه تست مثبت باشد بایستی با ما تماس بگیرید.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



اگر مایل باشید می توانید در مورد کورتاژ خود با یک مددکار بیمارستان صحبت کنید.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.