

Ilmo iska roodid caafimaad dartii oo la smeeyo goor hore

Tidig medicinsk abort




Waxaa aad marka hore liqi doontaa kiniin marka aad timaado qaybta. Haddii aad matagto muddo 30 daqiiqo gudahood ah waa in dib u soo laabataa isla markaana aad qaadato kiniin cusub.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



Waxaa dhici karaa in la dareemo xanuun aan kala joogsi laheyn iyo in dhiig badan kaa yimaado. Haddii aad si aad ah u dhiig baxdo ama aad xanuun aad u ba'an dareento waxaa haboon in aad booqato qaybta gargaarka deg-dega ah ee cudurada haweenka.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.




Waxaa uu dabiibku ka sii socon doonaa isbitaalka 24- 72 saacadood ka dib markii aad liqdey kiniinkii ugu horeeyey.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



Marka hore ka soo cun qureeca gurigga. Waxaa aad gurigga u soo qaadan doonta kiniin xanuun baabi'iyee ah. Fadlan liq kiniink xanuun baabi'iyee ah 30 daqiiqo ka hor inta aanad iman isbitaalka.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



Marka aad timaado isbitaalka waxaa aad xubinta taranka kor u galin doontaa 4 xabo oo kiniin ah. Haddii uu dhiig kaa iman waayo muddo 3 saacadood ka dib, waxaa loo baahanyahay in aad 2 xabo oo kale kiniin ah kor u galiso xubinta taranka.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


Ilmo iska roodid caafimaad dartii oo la smeeyo goor hore

Tidig medicinsk abort




Jiifso suuligana HA GELIN ilaa 30 mirir gudaheed ka dib markaad kiniinka liqday.

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.



Hadii xanuun ku qabto waxaad isticmaali kartaa barkimada la kululeeyo, TENS ama socsoco.

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



Waxaan ku siin karnaa kiniin xanuun baab'iye ah iyo irbad ay ku jirto maado lagu magacaabo morafiin.

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



Waxaan kaaga duri/mudi karnaa cirbad kabaabiso ah afka hore ee ilmo-galeenka. Haddii ay taasi dhacdo waxaa loo baahanyahay in lagugu fadhiisiyo kursiga loogu talogaley in lagu baadho haweenka si loo gaadhi karo afka hore ee ilmo-galeenka.

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.



Waxyeelooyinka sida caadiga ah ku yimaad qofka dabiibka ka dib waa xumada ama dhaxan, yalaalugo, matag iyo shuban.

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


Ilmo iska roodid caafimaad dartii oo la smeeyo goor hore

Tidig medicinsk abort




Waxaa aad isbitaalka qiyaastii joogi doontaa muddo 4-6 saacadood, markaa ka dib gurigga ayaad tegi kartaa. Lama ogolo in aad baabuur kaxeeyso markaad gurigga tageyso, maadaama lagu siiyey dawooyin saameyn ku yeelan karaa kartidaada falcelinta.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



Waxaa uu dhiiggu kaa socon doonaa muddo saddex maalmood ah, laakiin waxaa kale oo suurogal noqon karta in dhiiggu kaa sii socdo todobaadyo badan. Fadlan ha isticmaalin taanbooniga waaweyn, koobka caadada, ha dabaalan isla markaana ha sameyn wax galmo ah ilaa inta uu dhiiggu kaa socdo.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




Haddii uu dhiig aad u badan kaa yimaado ama uu ku qabto xanuun aad u ba'an isla markaan kiniinka xanuun baab'i'yuhu ku caawin waayo ama uu kaa yimaado dheecaan ama dhiig si xun u uraya, waa in aad sida ugu dhakhsaha badan u booqataa qaybya gar-gaarka deg-dega ah ee cudurada haweenka.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gyn.akutmott.



Marka ay 3 todobaad ka soo wareegato markaad iska soo ridey ilmaha, waa in aad sameysaa badhitaan kale oo ku saabsan in aad uur leedahay iyo in kale. Haddii tijaabada uurku uu tuso in aad wali uur leedahay waa in aad nala soo xidhiidhaa.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



Haddii aad rabto waxaa aad kala hadli kartaa in aad ilmo iska soo ridey tolo-bixiye (kurator).

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.