

منداڵ لەباربردنی پزشکی بە زوویی

Tidig medicinsk abort




دەشپیت تۆ لە بنکە ی پێشوازیە که حەبە که قووتدەیت. ئەگەر لە مێانە ی ۳۰ خولە کدا ریشایتە وە پێویستە تۆ بپیتە وە بۆ ئێرە و حەبێکی تازه وەرگرت.

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



رەنگە نازاریکی متت هەبیت و خوین بەربوون دەست پێبکات. ئەگەر خوینبەر بوونت زۆربوو یان ئەگەر نازاری زۆر بەهیزت هەبوو دەشپیت بچیت بۆ بنکە ی فریاگوزاری (ئەکیوت) ی ناو لەشی ژنان.

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.




چارەسەریە که لە نەخۆشخانە بەردەوام دەبیت ۲۴-۷۲ کاتژێر پاش ئەوە ی حەبە که ت قووتدا.

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



سەرەتا لە ماله وە بەرچایی بخۆ. تۆ حەبی نازارت وەرگرتوو و بردوتە وە ماله وە. حەبە که ۳۰ خولە ک پێش ئەوە ی بپیت بۆ نەخۆشخانە قووتدە.

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



کاتیکی دپیت بۆ نەخۆشخانە ۴ حەب وەرگرت و دەپخەیتە ناوی ناو وە ی زیو. ئەگەر خوینبەر بوون دەستی پێ نەکرد پاش ۳ خولە ک پێویست دەکات ۲ حەبی تریش بەخۆت هەلگرت.

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.

مندال له باربردنی پزشکی به زووی

Tidig medicinsk abort

	<p>پاش ئه وهی چه به کانت وهرده گریت پالکوهه و له میانه ی ۳۰ خوله کدا مه چۆ بۆ ته والیت.</p> <p>Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.</p>
	<p>ئه گهر تۆ ئازارت هه بیته ده توانیت ژانه که له ریگی به کارهینانی گۆشه ی گهرم، TENS یان جووله به خۆدانه وه که مکه یته وه.</p> <p>Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.</p>
	<p>ده توانیت چه بی ئازار شکین بدهینی و دهرزی مورفینت لیبدهین.</p> <p>Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.</p>
	<p>ههروه ها ئیمه ده توانین به نجی ناوچه بیته بکهین له ئاستی زئی و دهرجه ی مندالندان. له وه حاله ته دا پیویست ده کات له سه ر کورسیه کی پشکنینی ناو له شی ژنان دانیشیت بۆ ئه وه ی بتوانین ده ستمان بگاته دهرجه ی مندالندان.</p> <p>Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.</p>
	<p>ئاسایی یه گرتی نه خوازاو له بابه تی له رزوتا، دلنیکه له اتن، رشانه وه و سکچوونت بۆ بیته پاش چاره سه ریه که.</p> <p>Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.</p>


مندال لەبارەردنى پزىشكى بە زووى

Tidig medicinsk abort




تۆ نزيكهى 4-6 كازير له نهخوشخانه دهمنبتهوه، پاشان دهتوانيت بجيتهوه مالهوه. بۆت نيه ئوتومبيل ليخوپيت چونكه دهرمان وهردهگرپت كه پهنگه كاريگهري له تواناي پهچهكردارت بكات.

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.



دهشيت تۆ لاني كه م 3 رۆژ خوينهريبوونت ههبيت، بهلام پهنگه خوين بهريبوون چهندين ههفتهش بخايهنييت. ههتا نه و ههلهي خوينت ههريهه، تامپون/تهني خولي مانگانه باكارمههپنه، مهله مهكه يان جووت مهبه.

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




ئهگهريهجگار زۆر خوينت له بهر بروات يان نازاري وات ههبيت كه ههبي نازارشكين يارمهتيت نه دا يان ئهگهريه ليناواي بوگهنت ههبوو يان دووچارى چهند خوينهريبوونيك بوويت، دهشيت تۆ بجيت بۆ بنكهى فريياگوزارى (ئهكيوت) ناو لهشى ژنان.

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



پاش تپهريبووني 3 ههفته بهسهرمندال له باربردنهكه دا، دهشيت تۆ تيستيك بۆ دووگيانيتي بوون بكهيت. ئهگهري تيستهكه پۆزهتيف بوو پهيوهنديمان پيوه بكه.

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



گهريهويهيت، دهتوانيت تۆ لهگهلي تويزهريكي كۆمهلايه تي (كوراتور) دا باسي مندال له باربردنهكه بكهيت.

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.