

ዝቐደመ ሕክምናዊ ምንጻል ጥንሲ።

Tidig medicinsk abort




እታ ቀዳመይቲ መድሃኒት ኣብ መቐበል ኣጋይሽ ክትውሕጥያ ኢኹ። ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት እንተ ድኣ ኣምሊሱኪ፣ ግድን ተመሊስኪ ሓዳስ ከኒና ክትውሕጢ ኣለኪ።

Du ska svälja en första tablett på mottagningen. Om du kräks inom 30 minuter måste du komma tillbaka och få en ny tablett.



ቃንዛ ክሰምዓክን ደም ክፈሰክን ክጅምር እዩ። ብብዝሒ እንተ ድኣ ደሚኹ ወይ ኣዘዩ ሓያል ቃንዛ እንተ ድኣ ኣጋጢሙኪ ናብ ናይ ማህጸን ክፍሊ ህጹጽ ረዲኣት ኪዲ።

Du kan få molande värk och börja blöda. Om du blöder väldigt mycket eller får väldigt mycket värk ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



ናይ መጀመርታ ከኒና ምስ ወሰድኪ እቲ ኣብ ሕክምና ዝግበር ክንክን ካብ 24-72 ሰዓታት ይቕጽል።

Behandlingen fortsätter på sjukhuset 24-72 timmar efter att du svält den första tablett.



ኣብ ገዛ ንቕድም ቍርሲ ብልዒ። ኣብ ገዛኹ ፈውሲ ቃንዛ ኣሎኪ። ፈውሲ ቃንዛ ከኒና ናብ ሕክምና ቐቕድሚ ምምጻእኪ ቐድሚ ፍርቂ ሰዓት ወሓጥዮ።

Ät först frukost hemma. Du har fått med dig värktabletter hem. Svälj värktabletter 30 minuter innan du ska vara på sjukhuset.



ናብ ሕክምና ምስ መጻእኪ 4 ከኒናታት ብብልዕትኹ ተወስዲ። ከኒና ድሕሪ ምውሳድኪ ደም ክይመጽኣ ሰለስተ ሰዓታት እንተ ሓሊፎም ተወስኽቲ ክልተ ከኒናታት ምውሳድ ክድልየኪ እዩ።

När du kommer till sjukhuset får du föra upp 4 tabletter högt upp i slidan. Om du inte har börjat blöda efter 3 timmar behöver du föra upp 2 tabletter till.


ዝቐደመ ሕክምናዊ ምንጻል ጥንሲ።

Tidig medicinsk abort




ብኹቦ ተጋደሚ። መድሃኒት ምስ ወሰድኪ ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ናብ ሸቓቕ ከይትኸዱ።

Ligg ner och gå INTE på toaletten inom 30 minuter efter att du tagit tabletterna.



ቃንዛ እንተ ሃለወኪ ማይ ውዑይ ዝሕዝ ቦርሳን ምስ ነብሲ ዝጠብቕ ከቢብ ፕላስተር መሳልን ብምጥቃምን ብምንቕስቓስን ኣዕግስዮ።

Om du har ont kan det hjälpa med värmekudde, TENS eller att du rör på dig.



መዕገስ ቃንዛ ከኒናን ሞርፊን ዘሎዎ መርፍእን ክንህበኪ ንክእል ኢና።

Vi kan ge smärtstillande tabletter och injektioner med morfin.



ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ማህጸን መዕገሲ ቃንዛ ክንህበኪ ንክእል ኢና። ናብ ውሽጢ ማህጸንኪ ንክንኣቱ ምእንቲ ክጥዕመና ኣብ ንክምኡ መፈተሺ ዘገልግልን ዝጥዕምን ወንበር ኮፍ ክትብሊ ኢኺ።

Vi kan också ge lokalbedövning vid sidan av livmodertappen. Du behöver i sådana fall sitta i en gynekologisk undersökningsstol för att vi ska komma åt livmodertappen.




ምስ ኣሰድክዮ ዝመጽኡ ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ፡ ረስኒ፡ ምንቕጥቃጥ፡ ዕግርግር ምባል፡ ተምላስን ተቕማጥን እዮም።

Vanliga biverkningar är att du får feber eller frossa, illamående, kräkningar och diarré under behandlingen.


ዝቐደመ ሕክምናዊ ምንጻል ጥንሲ።

Tidig medicinsk abort




ንኸባቢ 4-6 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ሕክምና ድሕሪ ምጽናሕ ገዛኺ ክትኮዲ ትኽእሊ ኢኹ። ናይ ንጥፊታት ኩነታትኪ ክጸሉ ዝኽእል መድሃኒት ስለ ትወስዲ ማኪና እናዘወርኪ ክትኮዲ የብልክን።

Du stannar i ungefär 4-6 timmar på sjukhuset, sedan kan du gå hem. Du får inte köra bil hem eftersom du får läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga.




ብውሕዱ ንሰለስተ መዓልታት ክትደምዱ ኢኹ። ንብዝሕ ዝበሉ ሰውናት'ውን ክትደምዱ ትኽእሊ ኢኹ። መድመይቲ ክሳብ ዝሃለወኪ ኣብ ግዜ ጽግያት ወይ መድመይቲ ደም መምጻዊ ዝጠቅም መሳርሒ፡ ባቕን ስጋዊ ርክብን ክትገብርን ክትጥቀምን የብልክን።

Du ska blöda i minst 3 dagar, men du kan också blöda i flera veckor. Använd inte tampong/menskopp, bada eller ha samlag så länge du blöder.




ብዝሒ መድመይቲ እንተ ኣሎኪ ወይ ብፈውሲ ቃንዛ ክዕገስ ዘይክእል ቃንዛ እንተ ኣሎኪ፡ ሽታ ዘሎዎ ወይ ደም ዘሎዎ ፈሳሲ እንተ ኣሎኪ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረዲኦት ማህጸን ኪዲ።

Om du blöder väldigt mycket eller har så ont att det inte hjälper med smärtstillande tabletter eller om du har illaluktande flytningar eller blödningar, ska du åka till en gynekologisk akutmottagning.



ጥንሲኹ ድሕሪ ምንጻሉ ድሕሪ ሰለስተ ሰውናት ናይ ጥንሲ መርመራ ግበራ። እቲ መርመራ ኣወንታ(ፖዘቲቭ) እንተ ኾይኑ ተወከስና(ኣዘራርብና)

När det gått 3 veckor efter din abort, ska du ta ett graviditetstest. Om testet är positivt ska du kontakta oss.



እንተ ደሊኹ ብዛዕባ ዝተገለጸ ጥንሲኹ ምስ ኣማኻሪ ክትዘራረቢ ትኽእሊ ኢኹ።

Du kan få prata om din abort med en kurator om du vill.