


Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård

Provë e pështymës nga kollitja

Upphostningsprov



Ti do t' i japësh tri prova, një provë në ditë.

Du ska ta tre prov, ett prov om dagen.




Merri epruvetat në shtëpi.

Ta med rören hem.



Lëre provën në mëngjes para ngrënies.

Ta provet på morgonen innan du har ätit.



Hiqe tapën nga epruveta e madhe. Pastaj hiqe tapën nga epruveta e vogël.

Ta av korken till det stora röret. Ta sedan av korken på det lilla röret.



Kollitu thell gjersa nga mushkëritë të dalë këlbaza. Nuk mjafton vetëm pështyma.

Hosta långt nerifrån lungorna tills du får upp slem. Det räcker inte med saliv.

Mjekimi i infeksionit · Infektionssjukvård


Provë e pështymës nga kollitja

Upphostningsprov



Pështyje kelbazën në epruvetën e vogël. Mbylle epruvetën me tapën e vet.

Spotta ut slemmet i det lilla röret. Skurva på korken.




Vendose epruvetën e vogël në epruvetën e madhe. Mbylle me tapë.

Lägg det lilla röret i det stora röret. Sätt på korken.



Merre me vete provën sa më shpejt që të jetë e mundur në pranimin për infeksione ose në Qendrën shëndetësore Njëkohësisht. Prova mund të ruhet për një ditë në temperaturë të dhomës.

Ta med provet så fort som möjligt till infektionsmottagningen eller Närhälsans vårdcentral. Provet kan förvaras ett dygn i rumstemperatur.



Vepro njësoj edhe me dy provat e tjera.

Gör likadant med de två andra proverna.